

Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Senyawa Fenolik Makroalga Coklat *Sargassum* sp.

by Sedjati Et Al.

Submission date: 08-May-2022 08:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1830858107

File name: Lamp._V_C-10.pdf (484.99K)

Word count: 2957

Character count: 17632

Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Senyawa Fenolik Makroalga Coklat *Sargassum sp.*

Sri Sedjati*, Suryono, Adi Santosa, Endang Supriyatini dan Ali Ridlo

3

Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 50275
Email : sedjati69@gmail.com

Abstract

Present research was evaluated the antioxidant activities of extracts from macroalga *Sargassum sp.* In this study, seven filtrates from maceration (methanol pa and technical grade, ethanol pa and technical grade, methanol technical grade 50%, infused hot water, boiled water) were analyzed for total phenolic compound (TPC) and for antioxidant activities (DPPH method). The results revealed that the water filtrates possessed more TPC and antioxidant activity than alcoholic filtrates, and the highest was water filtrate from boiled *Sargassum sp.* ($TPC = 1,36 \pm 0,01$ mgGAE/g dry weight; % inhibition DPPH = $81,35 \pm 0,42$ %). The high positive correlation between TPC and antioxidant activity ($r = 0,99$) suggested that phenolic compound were the major antioxidant components. The effect of TPC (dependent variable) on DPPH radical inhibition (independent variable) with regression formula $y = 55,39 x + 5,18$.

Keywords : *Sargassum sp.*, phenolic compound, antioxidant activity.

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi potensial aktivitas antioksidan ekstrak *Sargassum sp.* Pada kajian ini, 7 filtrat hasil maserasi (metanol pa dan teknis, etanol pa dan teknis, metanol teknis 50%, perendaman air panas/hot infused, dan perebusan dengan air) dianalisis kandungan total fenoliknya (TPC) dan aktivitas antioksidannya (metoda DPPH). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa filtrat air memiliki kandungan TPC dan antioksidan yang relatif lebih tinggi dibanding filtrat alkohol dan yang tertinggi adalah filtrat hasil perebusan *Sargassum sp.* ($TPC = 1,36 \pm 0,01$ mgGAE/g berat kering; inhibisi DPPH = $81,35 \pm 0,42$ %). Korelasi positif yang tinggi antara TPC dan aktivitas antioksidan ($r = 0,99$) menunjukkan bahwa kandungan senyawa fenolik merupakan komponen utama yang menghasilkan aktivitas antioksidan. Pengaruh TPC (variabel bebas) terhadap inhibisi radikal DPPH (variabel terikat) sesuai dengan persamaan regresi $y = 55,39 x + 5,18$.

Kata kunci : *Sargassum sp.*, senyawa fenolik, aktivitas antioksidan.

PENDAHULUAN

Alga ^{10t} diketahui banyak mengandung senyawa bahan alam yang bersifat bioaktif. Beberapa senyawa di antaranya memiliki efek "pharmaceutical" sekaligus berfungsi sebagai kosmetik, sehingga muncul istilah "cosmeceutical". Arti dari istilah tersebut menunjukkan karakter suatu produk yang berada pada katagori kosmetik dan obat (drugs) (Agatonovic-Kustrin et al., 2016). Ekstrak alga laut banyak digunakan untuk bahan

¹²rawatan kulit, karena dapat merangsang regenerasi kulit, mengurangi kerutan, mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan sintesis kolagen (Fitton et al., 2016). Produk perawatan kulit "cosmeceutical" harus dapat memperbaiki fungsi dan struktur kulit, selain dapat meningkatkan penampakan kulit (Wang et al., 2015)

Menurut Fitton et al. (2016), sebuah perusahaan bioteknologi asal Australia, Marinova telah mengembangkan

6 Corresponding author
www.ejournal2.undip.ac.id/index.php/jkt

Diterima/Received : 18-05-2017, Disetujui/Accepted : 15-07-2017

senyawa bahan alam dari alga coklat *Undaria pinnatifida* dan *Fucus fesciculosus* sebagai bahan kosmetik. Ekstrak *Undaria pinnatifida* (fukoidan 89,6%, polifenol <2%, karbohidrat netral 48,8%, sulfat 27,4%, kation 9%) terbukti bersifat skin protecting, sedangkan ekstrak *Fucus fesciculosus* (fukoidan 58,6%, polifenol 33,7%, karbohidrat netral 43,7%, sulfat 10,1%, kation 3%) dapat mereduksi noda-noda penuaan, meningkatkan kecerahan kulit dan sebagai pelembab sekaligus pelembut kulit.

Sargassum sp., merupakan salah satu alga coklat yang kaya bahan bioaktif, di antaranya: alginat, fukoidan, fucoxantin, dan phlorotannin (senyawa fenolik yang khas pada alga coklat). Senyawa-senyawa tersebut banyak diaplikasikan untuk produk kosmetik perawatan kulit, karena bisa berfungsi sebagai bahan pengemulsi (emulsifier), pemutih kulit (skin whitening), pencegah penuaan (anti-ageing), anti kerutan (anti-wrinkle), pencegah alergi, maupun sebagai antioksidan.

Menurut Uppala (2015), ekstrak alga dapat digunakan dalam formula kosmetik dengan 2 tujuan yang berbeda, sebagai eksipien (emulsifier atau stabilizer) dan sebagai bahan bioaktif terapeutik (antioksidan, antibakteri, anti-inflamasi, dll).

Salah satu alga coklat, *Sargassum duplicatum* merupakan salah satu jenis rumput laut coklat dari Indonesia yang berpotensi sebagai antioksidan karena mengandung zat-zat aktif seperti fukoidan dan komponen fenolik (Lim et al., 2002). Jenis komponen fenolik yang banyak dijumpai pada rumput laut coklat ⁶ adalah phlorotanin yang berkisar antara 0.74% sampai 5.06% (Samee et al., 2009).

Pemicu utama masalah penuaan/kerusakan kulit adalah stres oksidatif, yang terjadi secara alamiah dan dipicu faktor lingkungan (seperti radiasi sinar matahari/UV, asap/polusi udara). Menurut Fitton et al., 2016, struktur sel alga mempunyai kemiripan dengan struktur kulit manusia, sehingga dapat diasumsikan senyawa bahan alam yang ditemukan di sel alga dapat bermanfaat

bagi kulit. Alga laut merupakan organisme fotosintetik yang sering terpapar sinar matahari dan oksigen tinggi, keduanya merupakan pemicu terbentuknya radikal bebas dan agen pengoksidasi (oksidator) yang kuat. Radikal bebas dan oksidator berpotensi merubah struktur dan fungsi sel, namun pada kenyataannya sel alga tidak mengalami kerusakan. Fenomena ini membuktikan bahwa alga laut memiliki mekanisme pertahanan anti oksidatif dan mengandung senyawa antioksidan.

Berdasarkan peluang tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang kandungan senyawa-senyawa tersebut dan melihat potensi antioksidannya. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk pengembangan bahan alami laut, khususnya ekstrak *Sargassum* sp. untuk perluasan produk kelautan, memasuki dunia industri kosmetik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan potensi antioksidan *Sargassum* sp. dan menganalisis kandungan senyawa fenoliknya (*total phenolic content*). Tolak ukur aktivitas antioksidan ditentukan berdasar kemampuannya sebagai penangkal radikal bebas (*free radical scavenging activity*).

MATERI DAN METODE

Materi utama yang digunakan adalah makroalga coklat *Sargassum* sp. yang diperoleh dari perairan Teluk Awur, Jepara. Materi pendukung berupa kertas saring, *aluminium foil*, bahan kimia untuk proses ekstraksi dan uji/analisis kimiawi. Bahan kimia tersebut meliputi :Etanol dan metanol (pro analisis dan teknis), aquades, natrium karbonat (Na_2CO_3), asam galat, dan asam askorbat/vitamin C. Reagen berupa DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), dan Folin-Ciocalteau.

Alat-alat yang digunakan berupa pralatan gelas (gelas piala, erlenmeyer, gelas ukur, corong, tabung reaksi, vial, pengaduk), neraca analitik, mikropipet, hot plate magnetic stirrer, magnetic bar, vortex/homogenizer, cuvet kaca, spektrofotometer UV-Vis.

Preparasi sampel sebelum digunakan penelitian dimulai dari perendaman *Sargassum* sp. segar dengan air tawar, pencucian dengan air mengalir dan pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara diangin-anginkan sampai kering, dihaluskan dengan blender, kemudian disimpan dalam wadah kedap udara.

Ekstraksi menggunakan metode maserasi. Sebanyak 1g *Sargassum* sp. kering dilarutkan dengan 20 ml pelarut (1:20). Pelarut yang digunakan adalah etanol (pa dan teknis), metanol (pa dan teknis), metanol teknis 50 %, dan aquades (panas/infused dan perebusan). Ekstraksi dilakukan dengan proses maserasi 24 jam pada suhu kamar (dikombinasi dengan pengadukan 30 menit menggunakan magnetic bar di awal maserasi). Perlakuan maserasi dengan air panas/infused menggunakan aquades panas (100°C), sedangkan perlakuan perebusan dilakukan dengan memanaskan sampel menggunakan hot plate magnetic stirrer(100°C¹⁴) 30 menit, kemudian dimerasasi 24 jam pada suhu kamar. Hasil maserasi disaring menggunakan kertas saring (Whatman no.1). Filtrat disimpan menggunakan vial kecildibungkus aluminium foil dan dianalisis TPC (total phenolic content), dan RSA (free radical scavenging activity).

Uji TPC (Total Phenolic Content)

Penentuan TPC filtrat menggunakan reagen Folin-Ciocalteau, sesuai dengan metode Norra et al.(2016) dengan sedikit modifikasi. Masing-masing filtrat sebanyak 200 μ l dimasukkan dalam tabung reaksi kecil dan ditambah dengan 1 ml reagen Folin-Ciocalteau (diencerkan 10 kali lipat dengan aquades). Setelah 5 menit dari proses pencampuran, ditambahkan 2 ml natrium karbonat (Na_2CO_3 7,5% w/v). Campuran dihomogenasi dengan vortex dan diinkubasi selama 120 menit pada suhu kamar. Absorbansi filtrat diukur pada panjang gelombang 765 nm dengan menggunakan Spektrofoto-meter (model Agilent Cary 60 UV-Vis.). Nilai TPC diekspresikan sebagai ekivalen mg asam galat (GAE)/g berat kering sampel.Kurva

standar asam galat yang dipakai adalah $y = 0,016x + 0,013$ ($r^2 = 0,992$). Kandungan total fenolik dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Total Fenolik} = \frac{axV/1000}{G}$$

Keterangan

a = konsentrasi asam galat (mg/L)

V = volume total larutan uji (ml)

G = massa sampel (g)

1000 = faktor konversi terhadap volume total larutan (ml)

Uji RSA (Free Radical Scavenging Activity)

Uji RSA dilakukan dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Uji DPPH menggunakan metode Norra et al. (2016). Masing-masing filtrat sebanyak 100 μ l dimasukkan dalam tabung reaksi kecil ditambah dengan 2,9 ml DPPH (konsentrasi 0,004% dalam metanol). Setelah 120 menit masa inkubasi (suhu kamar dan kondisi tanpa cahaya), larutan diukur absorbansinya pada panjang gelombang serapan maksimum dari DPPH (515 nm). Persentase inhibisiradikal bebas DPPH dihitung menggunakan rumus :

$$\text{In. DPPH (\%)} = \frac{(A_{\text{blanko}} - A_{\text{sampel}})}{A_{\text{blanko}}} \times 100$$

Keterangan

A blanko = Abs. DPPH tanpa sampel

A sampel = Abs. sampel + DPPH

Kurva standar asam ascorbat yang dipakai adalah $y = 3,93x + 7,82$ ($r^2 = 0,907$) dan potensi antioksidannya diekspresikan sebagai ekivalen mg asam ascorbat/ g berat kering sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan total fenol *Sargassum* sp. dari Perairan Teluk Awur, Jepara berkisar dari $0,11 \pm 0,01$ mgGAE/g sampai dengan $1,36 \pm 0,01$ mgGAE/g berat kering. Pelarut air dapat menarik lebih banyak senyawa fenolik dibanding pelarut alkohol. Merasasi dengan pelarut metanol teknis 50% dapat menarik senyawa fenolik sebesar $0,44 \pm 0,03$ mgGAE/g berat kering, sedangkan dengan air panas (infused hot water) total fenoliknya meningkat menjadi $0,95 \pm 0,03$ mgGAE/g berat kering. Perebusan selama 30 menit (suhu 100°C) dan


dilanjutkan dengan proses maserasi 24 jam menghasilkan kandungan total fenolik tertinggi, yaitu $1,36 \pm 0,01$ mgGAE/g berat kering (Gambar 1).

Penelitian sejenis sudah dilakukan oleh Wai et al. (2015), total TPC *Sargassum polycystum* dari Sabah (Malaysia) yang diperoleh secara maserasi 50% etanol (1:10) selama 2 jam dengan suhu 65°C adalah $0,37 \pm 0,01$ mgGAE/g berat kering. Ozgun (2015) meneliti beberapa makroalga coklat dari Teluk Iskenderun (Turki) yang dimaserasi dengan metanol (4°C ; 20 jam), TPC berkisar antara $0,36 \pm 0,04$ sampai $1,31 \pm 0,03$ mgGAE/ g berat kering, dan yang tertinggi adalah TPC *Sargassum schimperi*.


Keberadaan senyawa ini menjadikan *Sargassum polycystum* memiliki potensi antioksidan lebih tinggi dibanding rumput laut *Eucheuma denticulatum* dan *Kappahycus alvarezii*.

Hwang et al. (2010) juga meneliti *Sargassum hemiphyllum* (perairan Penghu County, Taiwan, namun diekstraksi dengan metode maserasi air panas. Ekstraknya memiliki potensi antioksidan (IC_{50}) sebesar 410 mg/L.


Karakter pelarut yang dipakai untuk proses ekstraksi menentukan tipe senyawa fenolik yang terekstrak (Liyana-Pathirana & Shahidi, 2005). Senyawa fenolik alga coklat secara alamiah bersifat bipolar, jadi bisa terdapat sebagai senyawa non polar sampai polar (Wei et al., 2003). Kombinasi alkohol dan air dapat mengambil golongan senyawa fenolik yang cenderung lebih polar, seperti flavonoid, catechin, rutin, dan quercetin (Spigno et al., 2007). Konsentrasi alkohol yang tinggi dapat mengekstrak pigmen, ataupun lemak, sehingga kadar fenol yang terambil relatif lebih kecil .Luo et al. (2010) juga meneliti tentang kandungan fenolik pada beberapa spesies genus *Sargassum*.



Gambar 1. TPC Filtrat *Sargassum* sp.(1) metanol teknis ; (2) metanol pa. ; (3) etanol teknis ; (4) etanol pa. ; (5) metanol teknis 50%; (6) air panas/infused ; (7) perebusan 30 menit



Gambar 2. Inhibisi (%) Filtrat *Sargassum* sp. terhadap Radikal DPPH : (1) metanol teknis ; (2) methanol pa. ; (3) etanol teknis ; (4) etanol pa. ; (5) methanol teknis 50%; (6) air panas/infused ; (7) perebusan 30 menit



Gambar 3. Pengaruh TPC terhadap Inhibisi (%) DPPH Filtrat *Sargassum* sp.: (1) metanol teknis ; (2) metanol pa. ; (3) etanol teknis ; (4) etanol pa. ; (5) methanol teknis 50%; (6) air panas/infused ; (7) perebusan 30 menit

Senyawa fenolik dari genus ini memiliki kepolaran medium (semi polar sampai polar). Pendapat ini didukung oleh Bambang (2013), senyawa fenolik

Sargassum sp. lebih banyak larut di etanol dibanding etil asetat dan n-heksana. Senyawa fenolik makroalga, termasuk alga coklat menunjukkan beberapa bioaktivitas

seperti antioksidan, antiradical, antialergi, antiradang, dan antiradiasi UV (Berthon et al., 2017). Fungsi lainnya adalah sebagai penghambat pelepasan histamin ketika terjadi peradangan kulit, sehingga mampu mencegah terjadinya dermatitis atopik (Heo et al., 2009).

Fungsi senyawa fenolik sebagai anti oksidan bisa dilihat dari kemampuan senyawa tersebut sebagai penangkal radikal bebas (*free radical scavenging*). Semakin tinggi persen inhibisi terhadap radikal bebas sintetis (DPPH), semakin besar potensi antioksidannya. Filtrat air (metode perebusan) menghasilkan potensi antioksidan tertinggi ($81,35 \pm 0,42\%$). Jika diekivalenkan dengan kurva standar asam ascorbat, maka setara dengan $0,37 \pm 0,01$ mg/g *Sargassum* sp. kering.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa filtrat air memiliki potensi antioksidan tertinggi. Penelitian Kuda et al. (2005) juga sama, ekstrak air alga coklat berpotensi antioksidan lebih tinggi dibanding ekstrak etanol. Secara mendasar terdapat hubungan/korelasi antara kandungan polifenol dan bioaktivitas penangkal radikal bebas. Heo et al. (2009) menyatakan polifenol *Sargassum* sp. adalah senyawa phlorotannin, yang merupakan oligomer dari phloroglucinol (fucol, phlor-ethol, dan eckol)

Total fenolik dari *Sargassum* sp. berkorelasi positif terhadap potensi antioksidan (Tao et al., 2009; Luo et al., 2010). Peningkatan konsentrasi TPC meningkatkan persentase inhibisinya terhadap radikal bebas, jadi potensi antioksidannya tergantung konsentrasi.

Korelasi (Pearson correlation) antara variabel TPC sampel *Sargassum* sp. dan persentase inhibisinya terhadap DPPH sangat kuat. Nilai korelasi positif yang mendekati 1 menunjukkan bahwa TPC memberi sumbangan yang sangat tinggi terhadap potensi antioksidan alga coklat tersebut.

KESIMPULAN

Filtrat air *Sargassum* sp. (metode perebusan 30 menit) memiliki kandungan

fenol terbesar, yaitu: $1,36 \pm 0,01$ mgGAE/g berat kering. Persentase inhibisi radikal bebasnya (DPPH) juga paling besar, yaitu : $81,35 \pm 0,42\%$. Senyawa fenoliknya cenderung bersifat polar dan lebih banyak terlarut di air dibanding pelarut alkohol. Pengaruh variabel bebas TPC terhadap variabel terikat inhibisi DPPH sesuai dengan persamaan regresi liniernya : $y = 55,39 x + 5,1$ ($r = 0,99$).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada reviewer dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatonovic-Kustrin, S., D. W. Morton, and P. Ristivojevic. 2016. Assessment of Antioxidant Activity in Victorian Marine Algal Extracts Using High Performance Thin-Layer Chromatography and Multivariate Analysis. *Journal of Chromatography A*, 1468: 228-35.
Bambang, B. S., S. Kumalaningsih, Susinggih W and Hardoko. 2013. Polyphenol Content and Antioxidant Activities of Crude Extract from Brown Algae by Various Solvents. *J. Life Sci. Biomed.*, 3(6): 439-443
Berthon, J., R. Nachat-Kappes, M. Bey, Jean-Paul C., I. Renimel, and E. Filarire. 2017. Marine Algae as Attractive Source to Skin Care. *Free Radical Research*, 51(6): 555-567.
Fitton, H. J., T. Oddie, D. Stringer, and S. K. Marinova. 2016. Marine Plant Extracts Offer Superior Dermal Protection OH. (March): 51-54.
Heo, S.J., Ko S.C., Cha S.H., Kang D.H. Park 2, and Choi Y. Effect of Phlorotannins isolated from *Ecklonia cava* on Melanogenesis and Their Protective Effect Against Photo-damaging Stress Induced by UV-B Radiation. *Toxicol. in Vitro*, 23 : 1123-1130 9
Hwang, Pai-An, Chwen-Herng W., Shu-Yun G., Shih-Yung C., and Deng-Fwu H. 2010. Antioxidant and Immune-Modulating Activities of Hot-Water Extract from Seaweed *Sargassum*

- 21 miphyllum. *Journal of Marine Science and Technology*, 18(1): 41-44.
- Ismail, A., Hong T.S., Antioxidant Activity of Selected Commercial Seaweeds. *Mal. J. Nutr.*, 8 : 167-177
- Kuda T., Tsunekawa M., Goto H., Araki Y. 2005. Antioxidant Properties of Four Edible Algae Harvested in The Noto Peninsula Japan. *J. Food Comp. Anal.*, 18 : 625-633.
- Liyana-Pathirana, C., Shahidi F. Optimization of extraction of phenolic compounds from wheat using response surface methodology. *Food Chem.*, 93:47-56.
- Lim, S.N., Cheung P.C., Ooi V.E., and Ang P.O. 2002. Evaluation of antioxidative activity of extracts from a brown seaweed, *Sargassum siliquastrum*. *J Agric Food Chem.* 50(13):3862-3866.
- Luo, H. Y., Bin W., Chun-Guang Y., You-le Q. and Chuan-ling S. 2010. Evaluation of antioxidant activities of five selected brown seaweeds from China. *Journal of Medicinal Plants Research*, 4(18) : 2557-2565,
- Machu, L., L. Misurcova , J. V. Ambrozova , J. Orsavova , J. Mlcek, J. Sochor and T. Jurikova. 2015. Phenolic Content and Antioxidant Capacity in Algal Food Products. *Molecules*, 20: 1118-1133
- Ozgu 5 S., F. Turan. 2015. Biochemical composition of some brown algae from Iskenderun Bay, the Northeastern Mediterranean coast of Turkey. *J. Black Sea/Mediterranean Environment* , 21(2): 125-134
- 18 Samee H, Li ZX, Lin H, Khalid J, and Guo, YC. 2009. Antiallergic effects of ethanol extracts from brown seaweeds. *Journal of Zhejiang University Science B.*,10(2):147-153
- 17 Spigno, G., Tramelli L., and De Faveri D. M. 2007. Effects of extraction time, temperature and solvent on concentration and antioxidant activity of grape marc phenolics. *J. of Food Engine.*, 81 (1): 200-208.
- Tao W., Rosa, Gudrun A. 2009. Total Phenolic Compound, Radical Scavenging and Metal Chelation of Extract from Iceland Seaweeds. *Food Chem.*, 116 : 240-248.
- Uppala, L. 2015. A Review on Active Ingredients from Marine Sources Used in Cosmetics. *SOJ Pharm Phamr Sci.*, 2(3): 1-3.
- Wai, C., Foong F., Chun Wai H., Wilson T. L. Y., Faridah A., and Chin P. T. 2015. Effects of Phenolic Antioxidants Extraction from Four Selected Seaweeds Obtained from Sabah PrePrints DOI : 10.7287/peerj.preprints.1249v1
- 16 Wang, H. M. D., C. C. Chen, P. Huynh, and J. S. Chang. 2015. Exploring the Potential of Using Algae in Cosmetics. *Bioresource Technology*., 184:355-362
- Wei Y., Li Z., Hu Y., Xu Z. Inhibition of Mouse Liver Lipid Peroxidation by High Molecular Weight Phlorotannins from *Sargassum kjellmanianum*. *J. Appl. Phycol.*, 15 : 507-511.

Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Senyawa Fenolik Makroalga Coklat Sargassum sp.

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | RANK | SOURCE | TYPE | PERCENTAGE |
|------|--|-----------------|------------|
| 1 | hdl.handle.net | Internet Source | 1 % |
| 2 | cora.ucc.ie | Internet Source | 1 % |
| 3 | Submitted to Universitas Diponegoro | Student Paper | 1 % |
| 4 | Min-Cheol Kang, Kil-Nam Kim, W.A.J.P.
Wijesinghe, Xiudong Yang, Ginnae Ahn, You-Jin
Jeon. "Protective effect of polyphenol
extracted from Ecklonia cava against ethanol
induced oxidative damage in vitro and in
zebrafish model", Journal of Functional Foods,
2014 | Publication | 1 % |
| 5 | regions.uard.bg | Internet Source | 1 % |
| 6 | www.scribd.com | Internet Source | 1 % |
-

- 7 Parapurath, Sudha Narayanan, Hebsibah Elsie Bernard, Dhanarajan Malli Subramaniamc, and Ramya Ramamurthy. "A Dimensional Investigation on Seaweeds: Their Biomedical and Industrial Applications", Handbook of Marine Macroalgae Biotechnology and Applied Phycology, 2011.
Publication
-
- 8 www.ejournal-s1.undip.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 9 jurnal.ugm.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 10 www.jurnal.utu.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 11 blog.naver.com <1 %
Internet Source
-
- 12 www.tribunnews.com <1 %
Internet Source
-
- 13 ejournal.unib.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 14 jurnal.poliupg.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 15 www.mdpi.com <1 %
Internet Source
-
- 16 www.tandfonline.com

Internet Source

<1 %

17 jfst.modares.ac.ir <1 %
Internet Source

18 www.academicjournals.org <1 %
Internet Source

19 eteze.ni.ac.rs <1 %
Internet Source

20 res.mdpi.com <1 %
Internet Source

21 Pallela, Ramjee, Ira Bhatnagar, Pranjal Chandra, and Se-Kwon Kim. "Allergy and Its Remedies from Marine Sources", *Marine Pharmacognosy Trends and Applications*, 2012.
Publication <1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Senyawa Fenolik Makroalga Coklat Sargassum sp.

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
