

Multiplikasi Tunas Tebu (*Saccharum officinarum* L Var. Bululawang) dengan Perlakuan Konsentrasi BAP dan Kinetin Secara In Vitro

by Sri Darmanti

Submission date: 01-Jul-2020 12:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 1352107390

File name: dengan_Perlakuan_Konsentrasi_BAP_dan_Kinetin_Secara_In_Vitro.pdf (277.86K)

Word count: 2772

Character count: 14813

Multiplikasi Tunas Tebu (*Saccharum officinarum* L Var. Bululawang) dengan Perlakuan Konsentrasi BAP dan Kinetin Secara *In Vitro*

Multiplication of Shoot Sugarcane (*Saccharum officinarum* L Var. Bululawang) on Concentration of BAP and Kinetin *In Vitro*

Chory Praseptiana^{1*}, Sri Darmanti², Erma Prihastanti²

¹Program Studi Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

²Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

*Email: chorynoprseptiana@gmail.com

Diterima 24 Maret 2017 / Disetujui 24 Agustus 2017

PENDAHULUAN

Tebu (*Saccharum officinarum* L) merupakan bahan baku utama dalam pembuatan gula, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi (Sukmadajaja, 2011). Menurut Ramadhan dkk. (2014) tebu varietas Bululawang sangat potensial karena memiliki daya adaptasi dan stabilitas yang baik pada berbagai jenis tanah serta memiliki rendemen yang tinggi yaitu sekitar 7,51%. Selama ini kebanyakan tebu Bululawang dilakukan secara vegetatif melalui stek, akan tetapi menurut Murwandono (2013) pembentukan tunas dengan stek cukup lama yaitu 2 sampai 4 bulan dan dari satu mata tunas hanya menghasilkan satu tunas, sehingga bibit yang dihasilkan sedikit (Priyono dkk., 2000), dan bibit mudah terinfeksi patogen penyebab penyakit (Malabadi et al., 2011).

Teknik kultur *in vitro* merupakan cara alternatif pengadaan bibit tebu yang berkualitas (FAO, 2008). Penyediaan bibit melalui kultur *in vitro* dapat dihasilkan bibit tebu dalam jumlah besar dengan waktu singkat serta bibit yang dihasilkan sehat dan seragam (George et al., 2008). Pengadaan bibit tebu melalui kultur *in vitro* dapat dilakukan dengan multiplikasi tunas, namun kendalanya laju pertumbuhan pada tebu Bululawang lambat karena dominansi apikal tinggi (P3GI, 2008) sehingga diberikan sitokinin pada media kultur *in vitro* (MS).

Menurut Niaz dan Quraishi (2002), sitokinin berperan dalam mengendalikan dominansi apikal dan menghilangkan dormansi tunas lateral, sehingga untuk memicu multiplikasi tunas diperlukan zat pengatur tumbuh sitokinin. Kinetin (6-furfuryl aminopurin) dan BAP (*Benzyl Amino Purin*) merupakan sitokinin sintesis yang berperan dalam menginduksi tunas (Schmulling, 2004). Kinetin berperan dalam ekspresi gen, mengaktifasi siklus sel, merangsang aliran Ca^{+2} , dan mencegah penuaan pada tanaman (Gaudino dan Pikkard, 1997), sedangkan BAP mempunyai aktivitas lebih stabil dan tahan terhadap oksidasi dibandingkan sitokinin lainnya (Nurjanah, 2009). Menurut (George et al., 2008), konsentrasi BAP dan kinetin yang tepat dapat meningkatkan multiplikasi tunas.

Menurut Vujovic et al. (2012) parameter yang diamati untuk mengetahui multiplikasi tunas, yaitu induksi tunas, panjang tunas, jumlah tunas, jumlah daun, dan warna tunas. Berdasarkan hasil penelitian Sukmadajaja (2011) pemberian BAP 2 mg/l dan kinetin 1 mg/l mampu menginisiasi munculnya tunas tebu Bululawang pada usia 10 HST, sedangkan pada penelitian Ali et al. (2008) pemberian BAP 0,5 mg/l dan kinetin 0,25 mg/l mampu menginisiasi munculnya tunas tebu BL-4 tercepat pada usia 10 HST dengan rata-rata jumlah tunas 1,94. Percobaan yang dilakukan Khan et al. (2009) pada multiplikasi tunas tebu varietas CPF-237 pada pemberian BAP 1 mg/l dan kinetin 0,1 mg/l dihasilkan tunas sebanyak 11 anakan selama 30 hari.

Penelitian kultur *in vitro* ini menggunakan eksplan mata tunas tebu (*Saccharum officinarum* var. Bululawang) usia 6 bulan pada medium MS dengan pemberian konsentrasi BAP (*Benzyl Amino Purine*) dan kinetin (*6-furfuryl aminopurine*). Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsentrasi BAP dan kinetin yang optimal untuk multiplikasi tunas tebu var. Bululawang secara *in vitro*. Mata tunas merupakan organ yang tersusun oleh jaringan muda yang sel-selnya masih aktif membelah (meristematik). Penggunaan mata tunas pada kultur *in vitro* diduga lebih efektif karena sudah terbentuk calon tunas yang diharapkan dapat membentuk tunas secara langsung sehingga dapat memotong satu tahapan kultur *in vitro*.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2016 di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani Cepu.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu botol kultur, gelas ukur, pipet tetes, gelas bekker, timbangan analitik, pH meter, spatula, spidol, stopwatch, autoclave, Laminar Air Flow Cabinet (LAF), magnetic stirrer, water bath, hot plate, alas papan, scalpel, pinset, bunsen, pisau,

inkubator, refrigerator, kamera, sprayer, aluminium foil, sikat, dan cutter.

Bahan-bahan yang digunakan, yaitu mata tunas tebu var. Bululawang umur 6 bulan yang diperoleh dari kebun tebu di Kecamatan Ungaran Timur, aquades steril, NaOH 0,1 N, HCl 0,1 N, medium MS lengkap dengan penambahan BAP dan kinetin pada tabel L.1, dan 0,02% (v/v) HgCl₂, alkohol 70%, spirtus, sabun cair, dan deterjen.

Cara Kerja Penelitian

1. Sterilisasi Alat dan Botol : semua alat dicuci, dikeringkan pada rak pengering, dan disterilisasi pada autoklaf suhu 121⁰C tekanan 1,5 atm selama 20 menit. Sterilisasi dilanjutkan dengan menggunakan oven pada suhu 60⁰C selama 30 menit. Alat-alat dari logam seperti, *scalpel*, dan pinset dimasukkan ke dalam alkohol 96% dan dipanaskan pada api bunsen.
2. Pembuatan Larutan Stok ZPT: BAP dan kinetin masing-masing ditimbang sebanyak 0,01 gram, kemudian masing-masing dilarutkan dalam 100 ml aquades steril dan dihomogenkan dengan *magnetic stirrer*. Larutan stok ZPT disimpan dalam refrigerator.
3. Pembuatan Media MS: unsur mikro, unsur makro, dan senyawa organik pada komposisi media MS yang telah dibuat menjadi larutan stok diambil sesuai takaran per liter media, kemudian ditambahkan sukrosa 30 g/l dan agar 8,5 g/l serta ditambahkan aquades sampai volume larutan menjadi 1000 ml. Larutan dihomogenkan dengan menggunakan *magnetic stirrer* sampai homogen.
4. Perlakuan ZPT pada media kultur: media MS dituangkan pada botol, kemudian ditambahkan larutan stok BAP dan kinetin (sesuai perlakuan) keadaan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* sampai homogen. pH campuran diatur hingga 5,8 dengan menambahkan 0,1N NaOH atau 0,1N HCl. Larutan disterilisasi pada autoklaf dengan suhu 121⁰C tekanan 1,5 atm selama 20 menit. Selanjutnya media disimpan pada ruang penyimpanan media.
5. Persiapan Eksplan: mata tunas tebu varietas Bululawang usia 6 sampai 8 bulan yang digunakan yaitu bagian paling ujung meristem,

dengan ukuran 1 sampai 2 cm dan dicuci dengan air keran selama 30 menit. Eksplan disiapkan dan diletakkan di sekitar LAF.

6. Sterilisasi Eksplan dan Penanaman:

- Mata tunas direndam dalam larutan 0,02% (v/v) HgCl₂ sambil digojog selama 3 menit dilakukan 2 kali.
- Mata tunas dibilas dengan aquades steril dilakukan 2 kali.
- Mata tunas direndam dalam alkohol 70% sambil digojog selama 5 menit.
- Mata tunas dibilas dengan aquades steril dilakukan 2 kali.

7. Penanaman Eksplan:

- Eksplan dipotong dengan ukuran 1 cm dan disayat pada bagian nodusnya menggunakan *scalpel*.
- Eksplan ditanam dalam media MS dengan tiap perlakuan dilakukan tiga ulangan.
- Kultur diberi label sesuai tanggal penanaman, dan diinkubasi pada suhu 25⁰C ± 2⁰C dengan 16 jam periode terang dan 8 jam periode gelap, intensitas cahaya 2500 sampai 3000 lux dan kelembapan 75% sampai 80% selama 8 minggu.
- Pengamatan visual dilakukan setiap hari selama 8 minggu, dan kultur yang terkontaminasi dikeluarkan dari ruang kultur.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 12 perlakuan ZPT, yaitu:

- P0 : (Kontrol) tanpa zat pengatur tumbuh
P1 : 0,5 mg/l kinetin
P2 : 1 mg/l kinetin
P3 : 0,5 mg/l BAP
P4 : 1 mg/l BAP
P5 : 2 mg/l BAP
P6 : 0,5 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin
P7 : 0,5 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin
P8 : 1 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin
P9 : 2 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin
P10: 2 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin
P11: 2 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin

Masing-masing perlakuan dengan 3 ulangan, setiap botol kultur masing-masing berisi satu eksplan.

Parameter Penelitian

1. Waktu munculnya tunas (HST) pada eksplan: diamati setelah inokulasi sampai muncul tonjolan kehijauan pada eksplan dengan ukuran lebih 2 mm.
2. Jumlah tunas: dihitung tunas yang tumbuh setiap eksplan yang hidup setelah inkubasi sampai akhir pengamatan (3 MST).
3. Tinggi tunas (cm): diukur dari pangkal nodus sampai ujung tunas setelah eksplan diinkubasi sampai akhir pengamatan (3 MST).

4. Jumlah daun (helai): dihitung dari munculnya tunas sampai sampai akhir pengamatan (3 MST).
5. Morfologi tunas: diamati secara visual setiap hari sampai akhir pengamatan (3 MST)

Analisis Data

Data jumlah tunas, panjang tunas, jumlah daun dan waktu pembentukan tunas dianalisis dengan uji ANOVA dengan taraf signifikansi 95%, dilanjutkan uji lanjutan *Duncan's Multiple Range Test (DMRT)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rata-rata waktu munculnya tunas (HST), panjang tunas (cm), jumlah tunas, dan jumlah daun (helai) pada tebu (*Saccharum officinarum* var. Bululawang) setelah perlakuan konsentrasi BAP dan kinetin yang berbeda

Perlakuan	Rata-rata			
	Waktu munculnya tunas (HST)	Panjang tunas (cm)	Jumlah tunas (tunas)	Jumlah daun (helai)
P0	2,33	0,97	1	1,39
P1	2,78	2,40	1	1,25
P2	2,78	2,46	2	2,41
P3	2,56	4,67	1,33	2,34
P4	2,56	1,77	2,67	2,86
P5	2,81	3,23	1,67	2,30
P6	2,56	4,46	4,46	3,74
P7	3,01	0,83	3,23	0,71
P8	2,24	2,31	3,33	2,54
P9	1,48	3,6	1	2,42
P10	1,95	3,38	1,67	3,51
P11	2,16	4,35	1,33	2,58

Keterangan: P0: Tanpa zat pengatur tumbuh; P1: 0,5 mg/l kinetin; P2: 1 mg/l kinetin; P3: 0,5 mg/l BAP; P4: 1 mg/l BAP; P5: 2 mg/l BAP; P6: 0,5 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P7: 0,5 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin; P8: 1 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P9: 1 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin; P10: 2 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P11: 2 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin

Hasil uji ANOVA (*Analysis of Variance*) pada taraf signifikansi 95% menunjukkan bahwa perlakuan BAP dan kinetin tidak berpengaruh terhadap rata-rata waktu munculnya tunas tebu var. Bululawang (Tabel 1).

Perlakuan tanpa zat pengatur tumbuh tetap menginduksi munculnya tunas, akan tetapi pada perlakuan P9 dengan konsentrasi BAP 1 mg/l dan kinetin 1 mg/l cenderung memberikan hasil tercepat waktu munculnya tunas dibandingkan P0

(kontrol) (Tabel 1). Hal itu kemungkinan karena pemberian sitokinin pada konsentrasi tersebut mampu meningkatkan konsentrasi hormon endogen dalam eksplan, yang kemudian merangsang pembelahan sel dan diferensiasi sel pada eksplan.

Menurut Ali *et al.* (2008), induksi tunas tebu terjadi karena proses pembelahan sel dan diferensiasi sel meristem yang dipengaruhi oleh keseimbangan dan interaksi hormon eksogen dengan hormon endogen. Hormon sitokinin berperan penting dalam pembelahan sel dan diferensiasi sel. Diferensiasi sel terjadi jika sel sudah mencapai volume maksimal, kemudian sel akan terspesialisasi dalam bentuk dan fungsi tertentu.

Menurut Harjadi (2009), pemberian BAP memacu sintesis protein sehingga mendorong terjadinya pembelahan sel yang menginduksi terbentuknya tunas. Menurut Hayati dkk (2010) sitokinin secara langsung berperan pada tahap interfase saat terjadinya proses transkripsi DNA dan translasi RNA untuk mensintesis protein. Protein yang terbentuk akan menyusun enzim-enzim yang berperan dalam pembelahan sel, yaitu enzim polimerase yang berperan dalam memperpanjang rantai DNA serta memperbaiki kesalahan penyusunan basa nitrogen, enzim ligase yang berperan dalam menggabungkan fragmen DNA, dan enzim kinase yang berperan mengontrol siklus sel. Adanya enzim-enzim tersebut proses pembelahan sel lebih efektif.

Panjang tunas, jumlah tunas dan jumlah daun tebu (*Saccharum officinarum L var. Bululawang*)


Hasil uji ANOVA pada taraf signifikan 95% menunjukkan bahwa perlakuan BAP dan kinetin tidak berpengaruh terhadap panjang tunas, jumlah tunas, dan jumlah daun tebu var. Bululawang (Tabel 1). Tabel 1 menunjukkan tunas dengan perlakuan tanpa zat pengatur tumbuh tetap mengalami pertumbuhan. Hal tersebut karena eksplan mengandung hormon endogen serta pada medium MS tersedia nutrisi untuk pertumbuhan eksplan. P3 cenderung memberikan hasil tertinggi panjang tunas tebu var. Bululawang dibandingkan

perlakuan kontrol. Perlakuan P6 yaitu: 0,5 mg/l BAP dan 0,5 mg/l kinetin cenderung memberikan hasil jumlah tunas dan jumlah daun terbanyak dibandingkan perlakuan kontrol, meskipun demikian pada perlakuan P0 (kontrol) tanpa pemberian BAP dan kinetin tetap terbentuk tunas dan daun. Menurut Lack (2001) eksplan memiliki hormon endogen yang berperan dalam pembelahan sel dan diferensiasi sel serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, akan tetapi hormon tersebut dimiliki tumbuhan dengan konsentrasi rendah.

Menurut Pierick (1982) sitokinin berperan dalam merangsang sintesis protein dan meningkatkan aktivitas sel-sel penyusun jaringan meristem. Sel-sel akan aktif membelah dan mengalami diferensiasi membentuk struktur dengan fungsi spesifik, setelah sel matang akan kehilangan kemampuan untuk membelah. Sel yang tumbuh dan berdiferensiasi akan berkembang membentuk jaringan penyusun tunas, dan daun tumbuhan. Pertumbuhan sel dan diferensiasi sel akan mempengaruhi morfogenesis.

Morfologi pada tunas tebu (*Saccharum officinarum L var. Bululawang*)

Data kualitatif berupa morfologi tunas tebu var. Bululawang diperlukan untuk mendukung data kuantitatif pada tabel 1. Gambar 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan tanpa zat pengatur tumbuh (Gambar 1.A) pada mata tunas menghasilkan tunas berwarna hijau tua dan belum memiliki daun. Hal tersebut karena unsur hara mengandung ion Mg^{2+} sebagai penyusun klorofil, meskipun tanpa pemberian ZPT tetapi tetap dihasilkan klorofil. Menurut Ai dan Yunia (2010), warna hijau pada daun dan tunas disebabkan karena kandungan klorofil di dalam kloroplas yang terdapat pada jaringan parenkim palisade dan parenkim spon daun. Menurut Kocot *et al.* (2011), pemberian sitokinin berfungsi dalam pembentukan klorofil khususnya mendukung transport ion Mg^{2+} ke dalam sel-sel mesofil daun, tetapi pemberian sitokinin dengan konsentrasi tinggi akan menurunkan akumulasi Mg^{2+} sehingga sintesis klorofil terganggu.



Gambar 1. Tunas tebu var Bululawang pada perlakuan kombinasi ZPT dengan dosis berbeda

Keterangan: P0: Tanpa zat pengatur tumbuh; P1: 0,5 mg/l kinetin; P2: 1 mg/l kinetin; P3: 0,5 mg/l BAP; P4: 1 mg/l BAP; P5: 2 mg/l BAP; P6: 0,5 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P7: 0,5 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin; P8: 1 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P9: 1 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin; P10: 2 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P11: 2 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin

Perlakuan P11 pada pemberian 2 mg/l BAP dan 1 mg/l kinetin menghasilkan tunas dan daun berwarna kuning. Menurut Balazc *et al.*(1967) penguningan daun terjadi karena adanya nekrosis (kerusakan sel), dan menurut Kocot *et al.* (2011) nekrosis terjadi karena gejala defisiensi Mg^{2+} . Menurut Pallavi dkk. (2012) kerusakan sel akan memicu terjadinya *browning* atau pencoklatan pada eksplan karena adanya hidroksilasi senyawa flavonoid tebu seperti: apigenin dan luteoleidin oleh enzim polifenol oksidase (PPO)

menghasilkan kuinon yang akan menyebabkan eksplan berwarna coklat (Blackweel, 2012).

Perlakuan P1 dan P2 terlihat tunas yang terbentuk kecil, karena pada pemberian kinetin dengan konsentrasi 0,5 mg/l dan 1 mg/l kemungkinan konsentrasi kinetin yang tinggi akan menghambat akumulasi ion Ca^{2+} yang berperan dalam menurunkan osmotik sel. Menurut Schumaker dan Gizinski (1993) kinetin berperan dalam menstimulasi pemasukan Ca^{2+} melalui saluran membran plasma.

Tabel 2. Warna tunas lateral tebu var. Bululawang usia 3 MST

Perlakuan	Tunas lateral	Warna tunas
P0	Ada	Hijau tua
P1	Ada	Hijau tua
P2	Ada	Hijau tua
P3	Ada	Hijau tua
P4	Ada	Hijau muda
P5	Ada	Hijau muda
P6	Ada	Hijau
P7	Ada	Hijau muda
P8	Ada	Hijau tua
P9	Ada	Hijau muda
P10	Ada	Hijau tua
P11	Ada	Kecoklatan

Keterangan: P0: Tanpa zat pengatur tumbuh; P1: 0,5 mg/l kinetin; P2: 1 mg/l kinetin; P3: 0,5 mg/l BAP; P4: 1 mg/l BAP; P5: 2 mg/l BAP; P6: 0,5 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P7: 0,5 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin; P8: 1 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P9: 1 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin; P10: 2 mg/l BAP + 0,5 mg/l kinetin; P11: 2 mg/l BAP + 1 mg/l kinetin

KESIMPULAN

Pemberian BAP dan kinetin pada konsentrasi 0 mg/l sampai 1,5 mg/l dan 2 mg/l tidak berpengaruh terhadap waktu munculnya tunas tebu var. Bululawang, namun pada pemberian BAP 1 mg/l dan kinetin 1 mg/l induksi tunas cenderung cepat. Pemberian BAP dan kinetin pada konsentrasi 0 mg/l sampai 1,5 mg/l dan 2 mg/l tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas tebu var. Bululawang, namun pada konsentrasi BAP 0,5 mg/l panjang tunas cenderung tinggi sedangkan pada konsentrasi BAP 0,5 mg/l dan kinetin 0,5 mg/l jumlah tunas dan jumlah daun cenderung lebih banyak.

Multiplikasi Tunas Tebu (*Saccharum officinarum* L. Var. Bululawang) dengan Perlakuan Konsentrasi BAP dan Kinetin Secara In Vitro

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	data.lipi.go.id Internet Source	1%
2	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	1%
3	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
4	R Suwinda, Warnita, I Chaniago. "Application of isolates of indigenous rhizobakteria: effect on the growth and yield of potato var. Cingkariang", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019 Publication	1%
5	www.kambingjoynim.com Internet Source	1%
6	www.krbogor.lipi.go.id Internet Source	1%
7	Muliani Muliani, Nurhidayah Nurhidayah, Koko	

Kurniawan. "HERBAL MANGROVE SEBAGAI SUMBER ANTI BAKTERI *Vibrio harveyi* PENYEBAB PENYAKIT PADA UDANG WINDU *Penaeus monodon*", Jurnal Riset Akuakultur, 2015

Publication

1%

8

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

1%

9

jurnal.umrah.ac.id

Internet Source

<1%

10

jurnal.untad.ac.id

Internet Source

<1%

11

crackdbs.com

Internet Source

<1%

12

edoc.pub

Internet Source

<1%

13

fapet.ub.ac.id

Internet Source

<1%

14

Desmin Tabuni, Jeany Polii-Mandang, Wenny Tilaar. "Penggunaan NAA (Naphthalene Acetic Acid) dan Kinetin (6- furfurylaminopurine) pada Induksi Tunas Kubis Bunga Putih (*Brassica oleraceae* L. var. *Botrytis*) secara in-vitro (Use of NAA (Naphthalene acetic acid) and Kinetin (6-furfurylaminopurine) For In-Vitro Shoot Induction of White Cabbage (*Brassica oleraceae* L. var.

<1%

Botrytis)", JURNAL BIOS LOGOS, 2018

Publication

15

Erviana Sari, Indriyanto ., Afif Bintoro. "Respon Setek Cabang Bambu Betung (Dendrocalamus Asper) Akibat Pemberian Asam Indol Butirat (AIB)", Jurnal Sylva Lestari, 2016

Publication

<1%

16

vdocuments.site

Internet Source

<1%

17

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1%

18

ml.scribd.com

Internet Source

<1%

19

repositorio.ufes.br

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Multiplikasi Tunas Tebu (Saccharum officinarum L Var. Bululawang) dengan Perlakuan Konsentrasi BAP dan Kinetin Secara In Vitro

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
