

Pengaruh Kumulatif Cekaman Biotik dan Abiotik Terhadap Penurunan Pertumbuhan Tajuk Tanaman Kedelai [*Glycine max* (L.) Merr.] cv. Grobogan

by Sri Darmanti

Submission date: 01-Jul-2020 12:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 1352110365

File name: biotik_Terhadap_Penurunan_Pertumbuhan_Tajuk_Tanaman_Kedelai.pdf (566K)

Word count: 1391

Character count: 8808

**Pengaruh Kumulatif Cekaman Biotik dan Abiotik Terhadap Penurunan
Pertumbuhan Tajuk Tanaman Kedelai [*Glycine max* (L.) Merr.] cv. Grobogan**

**Cummulative Effect of Biotic and Abiotic Stress to the Shoot Growth Decrease of
Soybean [*Glycine max* (L.) Merr.] cv. Grobogan**

Sri Darmanti

Departemen ²Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang
Email : darmantisri@yahoo.co.id

Diterima 27 Juni 2016 / Disetujui 15 Agustus 2016

PENDAHULUAN

Banyak penelitian tentang cekaman biotik atau abiotik pada tumbuhan dilakukan hanya

terhadap salah satu bentuk cekaman, tetapi pada kondisi alami tumbuhan sering terpapar pada cekaman ganda biotik dan abiotik (Pedrol *et al.*, 2006; Akinson & Urwin, 2012). Respon tumbuhan

terhadap cekaman ganda biotik dan abiotik berbeda dibanding respon tumbuhan terhadap cekaman tunggal biotik atau abiotik (Mittler, 2006; Rejeb *et al.*, 2014). Menurut Lehman and Blum (1999), hal tersebut dimungkinkan oleh adanya sentralisasi sistem respon pada tumbuhan, dengan demikian cekaman ganda harus dilihat sebagai satu bentuk cekaman baru yang berbeda dengan cekaman tunggalnya (Akinson & Urwin, 2012). Menurut Alexieva *et al.* (2003), pengaruh cekaman ganda dapat ditunjukkan sebagai persen (%) pengaruh kumulatif, yaitu perbandingan antara persen pengaruh cekaman ganda dengan persen pengaruh cekaman tunggal yang menyebabkan perubahan paling besar terhadap parameter yang diukur. Jika nilai persen pengaruh kumulatif lebih kecil dari 100%, maka cekaman ganda tersebut bersifat *cross adaptation* yang berarti bahwa salah satu cekaman menyebabkan menurunnya kepekaan tanaman terhadap cekaman yang lainnya, sebaliknya jika nilai persen pengaruh kumulatif lebih dari 100% maka cekaman ganda tersebut bersifat *cross synergism* yang berarti bahwa salah satu cekaman menyebabkan meningkatnya kepekaan tanaman terhadap cekaman yang lainnya.

Produksi kedelai secara nasional masih rendah (Anonim, 2012). Pada umumnya kedelai ditanam pada akhir musim penghujan, sehingga penyiangian gulma yang tidak sempurna yang menyebabkan persaingan berat antara tanaman kedelai dengan gulma dan rendahnya tingkat ketersediaan air tanah menjadi kendala biotik dan abiotik utama untuk meningkatkan produksi kedelai (Partohardjono, 2005; Atman, 2006; Anonim, 2009).

Gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki (Kohli *et al.*, 2006). Gulma dapat merugikan tanaman budidaya karena faktor kompetisi terhadap faktor tumbuh dan alelopati. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan sulit dipisahkan sehingga disebut sebagai “interferensi”. Kompetisi terhadap air meningkatkan cekaman kekeringan, sedangkan sintesis dan akumulasi alelokimia distimulasi oleh kompetisi dan

cekaman kekeringan (Qasem & Foy, 2001; Morvillo *et al.*, 2011).

Alelopati merupakan mekanisme interaksi antar tumbuhan melalui metabolit sekunder yang disebut alelokimia, yang berguna untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Alelokimia dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan tertentu yang ada di sekitarnya (Edreva *et al.*, 2008). Fenol merupakan senyawa utama yang berperan sebagai alelokimia dan dihasilkan tumbuhan dalam jumlah berlimpah (Narwal & Sampietro, 2009). Berbagai bentuk cekaman biotik dan abiotik akan meningkatkan produksi *Reactive Oxygen Species (ROS)* yang mengakibatkan terjadinya cekaman oksidatif, yaitu bentuk kerusakan sel yang disebabkan oleh oksidasi lipid, protein dan DNA, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi sel, menghambat pertumbuhan dan perkembangan sampai terjadi kematian tumbuhan (Gill & Tuteja, 2010).

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh kumulatif cekaman ganda yaitu cekaman abiotik berupa interferensi teki (*Cyperus rotundus* L.) dan cekaman abiotik berupa kekeringan terhadap penurunan pertumbuhan tajuk tanaman kedelai [*Glycine max* (L.) Merr.] cv. Grobogan .

METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat Penelitian

Benih kedelai [*Glycine max* (L.) Merr.] cv. Grobogan diperoleh dari Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (BALITKABI) Malang Jawa Timur. Umbi teki (*Cyperus rotundus* L.) diperoleh dari persawahan di kecamatan Tinjomoyo, Semarang.

Disain Penelitian

Penelitian menggunakan metode ekperimental rancangan acak lengkap dua faktor (3 X 3), yaitu faktor cekaman kekeringan K_0 = kontrol (FTSW 1), K_1 = ringan (FTSW 0,5) dan K_2 = berat (FTSW 0,25) dan faktor interferensi teki, yaitu T_0 = kontrol (0 teki), T_1 = tiga teki dan T_3 = enam teki, tiap unit perlakuan dengan 5 ulangan.

Penanaman dan Perlakuan

Benih kedelai diseleksi, dipilih yang mempunyai ukuran seragam. Umbi teki dipilih yang mempunyai berat seragam, disemaikan dan dipilih yang mempunyai 1 mata tunas. Penanaman kedelai dan teki dilakukan pada waktu bersamaan di dalam pot plastik diameter 25 cm, tiap pot berisi 3 kg media tanam berupa tanah latosol dan diberi pupuk dasar 1g TSP, 0,5g KCL dan 0,3g urea. Tiap pot ditanami satu kedelai dan teki dengan jumlah sesuai perlakuan. Perlakuan cekaman kekeringan 2 minggu sampai 5 minggu setelah tanam.

Penentuan Cekaman Kekeringan

Perlakuan cekaman kekeringan ditentukan berdasarkan nilai *The fraction of Transpirable Soil Water (FTSW)* (Haineman *et al.* 2011; Darmanti *et al.*, 2016³). Diperoleh berat pot beserta tanaman pada K_0 : 4,2 kg, K_1 : 3,8 kg dan K_2 : 3,6 kg. Penyiraman dilakukan setiap hari, jumlah air yang disiramkan ditentukan dengan menimbang pot beserta isinya sampai berat sama dengan berat seperti perlakuan.

Penentuan Persen (%) Pengaruh Kumulatif Cekaman Ganda

Penentuan persen pengaruh kumulatif cekaman ganda dengan rumus Alexieva *et al.* (2003) sebagai berikut :

$$PK = \frac{(A + B)}{B} \times 100$$

Keterangan :

- PK : % pengaruh kumulatif cekaman ganda .
- A : perubahan yang disebabkan oleh cekaman A .
- B : perubahan yang disebabkan oleh cekaman B (cekaman yang menyebabkan perubahan lebih besar dibanding cekaman A)
- (A + B) : perubahan yang disebabkan oleh cekaman ganda A dan B.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Menurut penyebabnya, cekaman dibedakan atas cekaman biotik dan abiotik.

Cekaman biotik disebabkan oleh hasil aktivitas organisme lain, sedang cekaman abiotik disebabkan oleh kelebihan atau defisit fisik atau kimia lingkungan (Apel & Hirt, 2004). Tumbuhan yang mendapat cekaman biotik maupun abiotik pada umumnya akan mengalami penurunan kecepatan proses fisiologis seperti absorpsi air dan hara, fotosintesis, respirasi, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi (Pedrol *et al.*, 2006). Dilaporkan oleh Darmanti dkk. (2016b), bahwa cekaman ganda biotik berupa interferensi teki dan abiotik berupa kekeringan menyebabkan menurunkan bobot basah, bobot kering dan panjang tajuk tanaman kedelai cv. Grobogan.


Analisis terhadap pengaruh kumulatif cekaman ganda interferensi teki dan kekeringan terhadap penurunan pertumbuhan tajuk kedelai cv. Grobogan yang ditunjukkan dengan parameter bobot basah tajuk (Gambar 1), bobot kering tajuk (Gambar 2) dan panjang tajuk (Gambar 3) pada semua kombinasi perlakuan menunjukkan nilai lebih 100% atau bersifat *cross synergism*. Hal tersebut diartikan bahwa salah satu dari kedua cekaman menyebabkan meningkatnya kepekaan tanaman kedelai cv. Grobogan terhadap cekaman yang lainnya (Alexieva *et al.*, 2003)

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Purwanto dan Agustono, (2010), yang menyatakan bahwa kompetisi kedelai dengan teki pada kepadatan teki 5, 10, 15 dan 20 per pot menurunkan luas daun, lebar stoma, kandungan klorofil, laju transpirasi dan laju fotosintesis tanaman kedelai. Perlakuan cekaman kekeringan yang terjadi bersamaan dengan kompetisi antara kedelai dengan teki memperberat pengaruh kompetisi terhadap pertumbuhan kedelai yang ditunjukkan dengan semakin besarnya penurunan luas daun, laju transpirasi, kandungan klorofil, laju fotosintesis dan lebar bukaan stoma pada tanaman kedelai yang mendapat perlakuan ganda kompetisi dan kekeringan dibanding dengan tanaman kedelai yang hanya mendapat perlakuan kompetisi. Sebaliknya Sanchez-Morerias *et al.* (2008) melaporkan bahwa perlakuan benzoxalin-2(3H)-one (BOA) dapat menghilangkan sifat toleran *Lactuca sativa* terhadap salinitas.


Pengaruh Kumulatif Cekaman Biotik dan Abiotik Terhadap Penurunan Pertumbuhan Tajuk Tanaman Kedelai [*Glycine max (L.) Merr.*] cv. Grobogan



Gambar 1. *Cross synergism* (>100) pengaruh kumulatif cekaman ganda interferensi teki (*Cyperus rotundus* L.) dan kekeringan terhadap bobot segar kedelai [*Glycine max (L.) Merr.* cv. Grobogan].



Gambar 2. *Cross synergism* (>100) pengaruh kumulatif cekaman ganda interferensi teki (*Cyperus rotundus* L.) dan kekeringan terhadap bobot kering kedelai [*Glycine max (L.) Merr.* cv. Grobogan].



Gambar 3. *Cross synergism* (>100) pengaruh kumulatif cekaman ganda interferensi teki (*Cyperus rotundus* L.) dan kekeringan terhadap panjang tajuk kedelai [*Glycine max (L.) Merr.* cv. Grobogan].

Menurut Mittler (2006) dan Akinson & Urwin (2012) pada kondisi cekaman ganda biotik dan abiotik, cekaman abiotik dapat dapat menyebabkan penurunan atau peningkatan kepekaan tanaman terhadap cekaman biotik atau sebaliknya. Selanjutnya dikatakan oleh Alexieva et

al. (2003) dan Li & Gong, (2011), bahwa cekaman ganda dapat meningkatkan pengaruh negatif pada tumbuhan, sehingga jauh melebihi total pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh semua faktor cekaman yang mengenainya. Pada kasus tertentu tumbuhan yang semula terpapar faktor cekaman

tunggal mampu meningkatkan resistensinya terhadap cekaman lain yang terjadi kemudian.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada cekaman ganda interferensi teki dan kekeringan terhadap pertumbuhan tajuk kedelai cv. Grobogan bersifat *cross synergism* atau salah satu dari kedua cekaman menyebabkan meningkatnya kepekaan tanaman kedelai cv. Grobogan terhadap cekaman yang lainnya.

Pengaruh Kumulatif Cekaman Biotik dan Abiotik Terhadap Penurunan Pertumbuhan Tajuk Tanaman Kedelai [Glycine max (L.) Merr.] cv. Grobogan

Pengaruh Kumulatif Cekaman Biotik dan Abiotik Terhadap Penurunan Pertumbuhan Tajuk Tanaman Kedelai [Glycine max (L.) Merr.] cv. Grobogan

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123dok.com

Internet Source

1%

2

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

3

repository.ipb.ac.id:8080

Internet Source

1%

4

www.scribd.com

Internet Source

1%

5

medicinaudayana.org

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Pengaruh Kumulatif Cekaman Biotik dan Abiotik Terhadap Penurunan Pertumbuhan Tajuk Tanaman Kedelai [*Glycine max* (L.) Merr.] cv. Grobogan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
