

Pengaruh Dosis Kompos dengan Stimulator Trichoderma terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jagung (zea mays l.) Varietas Pioner -11 pada Lahan Kering

by Sri Darmanti

Submission date: 01-Jul-2020 01:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 1352116473

File name: Pengaruh_Dosis_Kompos_dengan_Stimulator_Trichoderma.pdf (83.27K)

Word count: 2339

Character count: 14131

26
**Pengaruh Dosis Kompos dengan Stimulator Trichoderma terhadap
Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jagung (*zea mays L.*)
Varietas Pioneer -11 pada Lahan Kering**

10
Retno Afitin dan Sri Darmanti

Laboratorium Biologi Struktur dan Fungsi Tumbuhan, Jurusan Biologi FMIPA Undip

PENDAHULUAN

18
Pemanfaatan lahan kering di Indonesia saat ini masih belum optimal. Hal itu disebabkan karena sifat-sifat lahan kering yang mempunyai sumber air terbatas, tingkat kesuburan rendah dan tingkat erosi yang tinggi. Pemberdayaan lahan kering untuk agribisnis bukan saja dapat menambah pendapatan para petani tapi juga dapat memberi manfaat dalam konservasi tanah. Pemberdayaan lahan kering dapat dilakukan dengan pengembangan komoditas pertanian yang sesuai dengan tata guna lahan (Irawan dan Pranadji, 2002). Komoditas pertanian yang biasa

ditanam pada lahan kering yaitu ubi kayu, jagung dan kacang tanah.

Jagung mampu hidup pada lahan kering. Selain itu, jagung merupakan komoditi pangan yang sangat penting setelah padi. Sebagai sumber karbohidrat kedua setelah beras, jagung memegang peranan penting sebagai bahan pangan, makanan ternak dan bahan baku industri. Disamping itu, kebutuhan jagung setiap tahun semakin meningkat, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan produksi jagung. Salah satu upaya meningkatkan produksi jagung pada lahan kering adalah

perbaikan lahan pertanian dengan pemberian pupuk organik (Suprpto, 1998).

Pupuk organik terdiri atas pupuk kandang, pupuk hijau dan pupuk kompos. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang terjadi karena proses penghancuran bahan-bahan organik hasil kerjasama faktor lingkungan dan mikroorganisme (Syarief, 1986). Kompos memiliki unsur hara lengkap baik makro maupun mikro dan sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan produksi. Tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah dengan jumlah dan perbandingan yang berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Kebutuhan hara ini dapat dipenuhi dengan penambahan hara ke tanah melalui pemupukan. Kompos dapat memperbaiki sifat fisik tanah seperti struktur tanah, tekstur tanah, memperbaiki tata air dan udara tanah, memperbaiki suhu tanah menjadi lebih stabil, mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara sehingga tidak mudah larut oleh air. Selain itu kompos dapat memperbaiki sifat kimiawi tanah karena daya absorpsi dan daya tukar kation yang besar. Kompos juga dapat memperbaiki sifat biologi tanah yaitu memperbaiki kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Hal ini sangat baik untuk konservasi tanah pada lahan kering.

Pembuatan kompos dapat terjadi lewat proses alami. Bahan-bahan organik akan membusuk atau lapuk menjadi kompos dan proses ini biasanya membutuhkan waktu cukup lama yaitu \pm 90 hari (Murbando, 1990). Mengingat kebutuhan kompos yang semakin meningkat, maka perlu suatu langkah untuk mempercepat pengomposan yaitu dengan penambahan stimulator selama pengomposan. Salah satu stimulator yang dapat digunakan adalah Trichoderma. Trichoderma merupakan salah satu jenis fungi atau jamur yang menghasilkan enzim selulase serta enzim lain yang mendegradasi kompleks polisakarida. Kandungan enzim selulase Trichoderma dapat mendegradasi selulosa sehingga pembusukan bahan organik akan terjadi dengan cepat. Potensi ini sangat bermanfaat bagi sektor pertanian karena dapat digunakan dalam proses pengomposan. Pengomposan dengan stimulator Trichoderma biasanya membutuhkan waktu sekitar 21-45 hari (Cuevas, 1997). Dari latar belakang tersebut diatas maka perlu dikaji bagaimanakah pengaruh pemberian kompos

dengan stimulator Trichoderma terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pada lahan kering dan pada dosis berapakah kompos dengan stimulator Trichoderma ini dapat menghasilkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung paling tinggi pada lahan kering.

12 BAHAN DAN METODE

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan berupa dosis pemupukan, yaitu : D0 : 0 ton / Ha (kontrol), D1 : 15 ton / Ha, D2 : 30 ton / Ha dan D3 : 45 ton / Ha.

Pupuk kompos dibuat dari bahan sampah dengan stimulator Trichoderma dengan konsentrasi 1% (b/b), dengan masa inkubasi 6 minggu. Media tanam dibuat dengan membuat petak tanah seluas 1 x 1 m², kemudian dicampur pupuk kompos dengan dosis sesuai dosis perlakuan, yaitu : D0 : 0 ton / Ha (kontrol), D1 : 15 kg/m², D2 : 3 kg / m² dan D3 : 4,5 kg / m². Selanjutnya dilakukan pembibitan, pemeliharaan, seleksi dan pemberantasan gulma. Pemanenan dilakukan setelah tanaman berumur 55 hari dan diamati parameter sebagai berikut : tinggi tanaman (cm), berat kering tanaman (gr), berat kering biji (gr) dan jumlah biji. Sebagai parameter pendukung adalah C/N rasio, kandungan P, K dan N. Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis of Varians (Anava), bila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata terkecil (BNT) pada taraf uji 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dari penelitian mengenai pengaruh dosis kompos dengan stimulator Trichoderma terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel.1 Rerata tinggi tanaman (cm), berat kering tanaman (g), jumlah biji dan berat kering biji (g) tanaman jagung setelah perlakuan kompos dengan stimulator *Trichoderma*.


Dosis Parameter	DO	D1	D2	D3
Tinggi tanaman (cm)	93,87 ^a	105,57 ^b	117,17 ^c	112,17 ^c
Berat kering tanaman (g)	144,77 ^d	200,47 ^e	216,93 ^f	226,73 ^f
Jumlah biji	237,53 ^g	256,47 ^g	319,60 ^h	366,67 ⁱ
Berat kering biji (g)	78,50 ^j	120,97 ^k	156,17 ^l	155,77 ^l

Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama pada satu baris menunjukkan berbeda tidak nyata.

Dari analisis anova menunjukkan bahwa kompos dengan stimulator *Trichoderma* berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan kompos dengan stimulator *Trichoderma* terhadap tinggi tanaman jagung berbeda nyata dengan kontrol. Uji beda nyata terkecil (BNT) untuk tinggi tanaman menyatakan bahwa D1, D2 dan D3 berbeda nyata dengan control (D0). D1 berbeda nyata dengan D3. Sedangkan antara D2 dan D3 tidak berbeda nyata. Sementara Uji BNT untuk berat tanaman jagung menunjukkan bahwa antara D1, D2 dan D3 berbeda nyata dengan D0. D1 berbeda nyata dengan D2 dan D3. Sedangkan antara D2 dan D3 tidak berbeda nyata. Dalam bentuk histogram pertumbuhan tanaman dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Rerata tinggi tanaman (cm) setelah perlakuan kompos dengan stimulator *Trichoderma*.



Gambar 2. Rerata berat kering tanaman (g) setelah perlakuan kompos dengan stimulator *Trichoderma*.

Hasil dari perlakuan D0, D1, D2 dan D3 yang diamati memberikan informasi bahwa pemberian kompos dengan stimulator *Trichoderma* menyebabkan pertumbuhan tanaman meningkat dengan semakin tingginya dosis. Namun pada D2 sudah menunjukkan pertumbuhan yang optimal.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dosis 1,5 kg/m² (D1) sudah berpengaruh nyata pada berat tanaman dan tinggi tanaman. Hal ini disebabkan pemberian kompos dengan stimulator *Trichoderma* dapat meningkatkan kandungan hara pada tanah. Dari hasil analisis kandungan unsur hara kompos dengan stimulator *Trichoderma* dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Kandungan unsur N, P dan K tanah sebelum perlakuan dan setelah perlakuan kompos dengan stimulator Trichoderma pada minggu ke-6.

Jenis stimulator	Kandungan unsure hara (%)		
	N	P	K
Kontrol	1,4	0,095	0,60
Trichoderma	1,92	0,105	0,92

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa kompos dengan stimulator Trichoderma dapat meningkatkan kandungan hara tanah. Meningkatnya dosis pemberian kompos akan menyebabkan semakin tinggi pula kandungan unsur hara pada tanah. Unsur hara tersebut akan digunakan oleh tanaman untuk melangsungkan hidupnya diantaranya proses fotosintesis dan respirasi (Harjadi, 1979). Menurut Agustina (2004) dan Poerwidodo (1993) nitrogen, fosfor dan kalium dibutuhkan dalam jumlah besar pada setiap tahap pertumbuhan tanaman khususnya pada saat pertumbuhan vegetatif seperti dalam perkembangan batang dan daun.

Unsur nitrogen, fosfor dan kalium sangat penting bagi tanaman karena berperan dalam pembentukan asam amino, protein, asam nukleat dan klorofil. Klorofil berperan dalam fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat. Karbohidrat sederhana yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan digunakan untuk proses respirasi menghasilkan ATP, membentuk lipid, asam nukleat, dan protein yang selanjutnya digunakan untuk membentuk batang, daun, akar dan jaringan baru.

Selain itu, kompos mempunyai manfaat lain yaitu memperbaiki sifat fisik tanah. Secara lengkap tingkat erodibilitas tanah sebagai salah satu sifat fisik tanah dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3. Tingkat erodibilitas tanah sebelum dan setelah pemberian kompos dengan Stimulator Trichoderma.

No	Waktu pemberian kompos	Tingkat erodibilitas (ton/ha)	Keterangan
1	Sebelum perlakuan	66,37	Tinggi
2	Saat awal tanam		
	•Kontrol	47,55	Agak Tinggi
	•Trichoderma	54,16	Agak Tinggi
3	Setelah panen :		
	• Kontrol	33,08	Sedang
	• Trichoderma	0,61	Amat Rendah

Lahan yang digunakan untuk penanaman jagung pada penelitian ini adalah lahan kering. Lahan kering umumnya memiliki indeks erodibilitas yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari data erodibilitas tanah sebelum dan setelah panen pada table 3. Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa tanah yang digunakan sebagai media mempunyai tingkat erodibilitas 66,37. Tanah dengan indeks erodibilitas tinggi berarti mudah tererosi. Makin terkikisnya lapisan top soil tanah maka banyak unsur hara akan hilang. Akibatnya tanah menjadi kurus dan pasokan mineral serta hara lain yang dibutuhkan tanaman akan berkurang. Berkurangnya pasokan mineral dan unsur hara maka proses metabolisme dalam tubuh tanaman terhambat sehingga pertumbuhan tanaman akan menurun.

Setelah penambahan kompos dengan stimulator Trichoderma, indeks erodibilitas tanah menjadi 0,61 yang berarti agak lambat. Penurunan pada indeks erodibilitas disebabkan oleh bahan organik yang terkandung pada kompos dengan stimulator Trichoderma yang cukup tinggi yaitu sebesar 37,22 (Tabel 4).

Tabel 4. Kandungan bahan organik tanah setelah perlakuan kompos dengan Stimulator Trichoderma

No	Bahan stimulator	Bahan Organik (%)	
		Sebelum tanam	Setelah tanam
1	Tanpa kompos (control)	11,25	2,54
2	Trichoderma	37,22	2,74

Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan bahan organik setelah penambahan kompos dengan stimulator Trichoderma lebih tinggi dibanding kontrol. Menurut Sutedjo dan Kartasapoetra (2004), meningkatnya kandungan bahan organik pada tanah dapat menurunkan tingkat erodibilitas tanah karena bahan organik dapat mengikat dan mempertahankan kemantapan struktur tanah pada tanah. Tanah yang ringan atau mudah tererosi akan menjadi lebih berat sehingga tidak mudah tererosi dengan penambahan kompos. Dengan demikian pemberian kompos Trichoderma dapat mencegah erosi tanah.


Selain perbaikan sifat fisik, kompos juga memperbaiki sifat kimia tanah. Penambahan kompos menyebabkan daya absorpsi tanah dan daya tukar kation menjadi lebih besar. Hal ini berpengaruh pada penyerapan hara tanah oleh tanaman. Dengan meningkatnya daya absorpsi dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) maka penyerapan hara lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman.

Dari segi biologi tanah kompos dapat menambah jumlah dan memperbaiki kehidupan mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah ini berguna untuk meningkatkan hara melalui proses fiksasi dan menambah udara tanah. Dengan banyaknya mikroorganisme tanah secara tidak langsung tanah menjadi lebih subur dan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman.


Pemberian kompos pada dosis 4,5 kg/m² (D3) dibandingkan pada dosis 5 kg/m² (D2) tidak menunjukkan peningkatan pada pertumbuhan tanaman (berat tanaman dan tinggi tanaman). Hal itu menunjukkan bahwa batas optimal pemberian kompos untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal adalah 3 kg/m² (D2). Pada dosis 3 kg/m² (D2), pemberian kompos sudah mencapai tingkat optimum untuk dapat dimanfaatkan tanaman.

Tanaman mengambil unsur hara hanya sampai batas tertentu sesuai kebutuhannya, bila terdapat berlebih maka tidak akan diabsorpsi oleh tanaman.

Hasil penelitian mengenai produksi tanaman jagung dengan parameter jumlah biji dan berat basah biji jagung menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Berdasarkan uji BNT untuk jumlah biji dapat diketahui bahwa D2 dan D3 berbeda nyata dengan D0. Sementara antara D0 dengan D1 tidak berbeda nyata untuk berat biji



Gambar 3. Rerata jumlah biji setelah perlakuan kompos dengan stimulator Trichoderma.



Gambar 4. Rerata berat kering biji (g) setelah perlakuan kompos dengan stimulator Trichoderma.

Hasil dari perlakuan D0, D1, D2 dan D3 yang diamati memberikan informasi bahwa pemberian kompos dengan stimulator Trichoderma menyebabkan produksi tanaman meningkat dengan semakin tingginya dosis. Namun seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 peningkatan berat biji hanya terjadi pada tingkat pemberian dosis tertentu yaitu 3 kg/m² (D2). Perlakuan dosis 1,5 kg/m² (D1) sudah memberi pengaruh nyata pada berat biji (produksi tanaman). Hal ini disebabkan pemberian kompos dapat meningkatkan unsur hara pada tanah. Kandungan hara tanah yang cukup banyak pada penambahan kompos ini didukung

oleh sifat fisik tanah dengan terhambatnya erosi tanah sehingga pencucian hara terhambat. Terhambatnya pencucian hara menyebabkan unsur hara dapat dipertahankan.

Kandungan hara pada tanah menyebabkan pertumbuhan vegetatif tanaman jagung menjadi baik. Pertumbuhan vegetatif baik, maka pertumbuhan generatif menjadi baik pula. Pada pertumbuhan vegetatif terjadi proses pembentukan jaringan dan organ seperti akar, batang dan daun yang semuanya akan digunakan untuk melangsungkan hidupnya. Akar akan menyerap air, hara dan mineral dari dalam tanah. Batang berperan dalam memberi kekuatan dan menyokong tubuh tanaman, sementara daun berperan dalam pembentukan makanan melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diedarkan keseluruh tubuh dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan.

Kebutuhan tanaman pada fase produksi akan terpenuhi dengan mudah bila pertumbuhan vegetatif tanaman maksimal. Pada fase produksi terjadi penumpukan cadangan makanan pada buah. Dengan pertumbuhan yang maksimal maka fotosintat dan cadangan makanan yang dihasilkan juga akan lebih banyak.

Selain itu, pada tanah setelah pemberian kompos dengan stimulator Trichoderma, kandungan unsur hara masih cukup banyak untuk pembentukan buah dan biji (fase reproduktif tanaman). Hal ini dapat dilihat dari kandungan hara tanah pada Tabel 2. Novizan (2004) menyatakan pada fase produksi ini membutuhkan unsur N karena pada fase ini kebutuhan hormone dan enzim cukup besar. Untuk merangsang pembentukan bunga, buah dan biji serta membuat biji menjadi lebih besar maka tanaman memerlukan unsur P dan untuk meningkatkan translokasi gula pada pembentukan pati dan protein (cadangan makanan) tanaman memerlukan unsur K. Semua unsur tersebut dapat terpenuhi dengan adanya penambahan kompos.

Sementara pemberian kompos pada dosis $4,5 \text{ kg/m}^2$ (D3) dibandingkan pada dosis 3 kg/m^2 (D2) tidak menunjukkan peningkatan pada berat biji. Tidak adanya peningkatan pertumbuhan tersebut menandakan bahwa batas optimal pemberian kompos untuk mendapatkan berat biji yang maksimal adalah 3 kg/m^2 (D2). Hal ini

disebabkan oleh pemberian kompos yang sudah mencapai tingkat optimal untuk dapat dimanfaatkan tanaman. Tanaman mengambil unsur hara hanya sampai batas tertentu sesuai kebutuhannya, bila terdapat berlebih maka tidak akan dimanfaatkan oleh tanaman.

Menurut Novizan (2004) pemberian dosis pupuk harus tepat karena terdapat fenomena "Peningkatan Hasil yang Menurun". Fenomena tersebut berarti pemberian pupuk harus diberikan pada dosis yang tepat karena produktivitas tanaman dapat mencapai maksimal dengan pemberian pupuk pada dosis tertentu. Penambahan pupuk tak akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas bahkan menambah biaya produksi sehingga pendapatan menurun.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompos dengan stimulator Trichoderma berpengaruh meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pada lahan kering dan dosis 3 kg / m^2 merupakan dosis optimal untuk pertumbuhan dan produksi jagung (*Zea mays L.*) varietas Pioner-11.

Pengaruh Dosis Kompos

Pengaruh Dosis Kompos dengan Stimulator Trichoderma terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jagung (zea mays l.) Varietas Pioner -11 pada Lahan Kering

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Sogang University Student Paper	1%
3	biologiskripsi.blogspot.com Internet Source	1%
4	snackdoc.blogspot.com Internet Source	1%
5	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1%
6	elib.pdiilipi.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1%
8	Merlin Korejang Merlin Korejang, Selvie D. Anis, W.B. Kaunang, C.I.J. Sumolang. "RESPONS	<1%

PERTUMBUHAN RUMPUT *Brachiaria humidicola* cv Tully DENGAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK BOKASHI KOTORAN AYAM PETELUR", ZOOTEK, 2018

Publication

9	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	<1%
10	de.scribd.com Internet Source	<1%
11	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
12	zombiedoc.com Internet Source	<1%
13	repo.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
14	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
15	www.boilersindustri.xyz Internet Source	<1%
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
17	idtesis.com Internet Source	<1%

18	www.bnp2tki.go.id Internet Source	<1%
19	sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
20	journal.bio.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
21	Cicilia Tri Kusumastuti, Ardiyanta Ardiyanta. "Respon Pertumbuhan dan Kualitas Hasil Beberapa Varietas Tomat pada Berbagai Frekuensi Penyiraman", Savana Cendana, 2019 Publication	<1%
22	soil.faperta.ugm.ac.id Internet Source	<1%
23	Lidyanti Olo, Parluhutan Siahaan, Beivy Kolondam. "Uji Penggunaan PGPR (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria) terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Cabai Merah (capsicum Annuum L.)", Jurnal MIPA, 2019 Publication	<1%
24	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	<1%
25	perpusnwu.web.id Internet Source	<1%
26	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%

27

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

<1%

28

Taufan P Daru, Odit F Kurniadinata, Yabel Noberto Patandean. "Pengaruh Dosis Pupuk Kandang dan Jarak Tanam Terhadap Produksi Rumput Gajah Mini (*Pennisetum purpureum* cv. Mott)", *Jurnal Pertanian Terpadu*, 2019

Publication

<1%

29

Tommy D. Sondakh, Djuhardi N. Joroh, A. G. Tulungen, D. M.F. Sumampow, Lita B. Kapugu, Rinny Mamarimbing. "HASIL KACANG TANAH (*Arachys hypogaea* L.) PADA BEBERAPA JENIS PUPUK ORGANIK", *EUGENIA*, 2012

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Pengaruh Dosis Kompos dengan Stimulator Trichoderma terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jagung (zea mays l.) Varietas Pioner -11 pada Lahan Kering

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
