

Identifikasi Fishing Ground Ikan Teri (Stolephorus sp) Menggunakan Citra Modis di Perairan Karimunjawa, Jepara *by Lilik Maslukah*

Submission date: 06-Nov-2022 05:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 1945509162

File name: 08._Identifikasi_Fishing_Ground_Ikan_Teri_Stolephorus_sp.pdf (1.09M)

Word count: 3582

Character count: 20858

Identifikasi *Fishing Ground* Ikan Teri (*Stolephorus* sp) Menggunakan Citra Modis di Perairan Karimunjawa, Jepara

Rizky Aditya N¹, Anindya Wirasatriya^{1,2*}, Kunarso, Lilik Maslukah^{1,2}, Petrus Subardjo¹, Agus Anugroho Dwi Suryosaputro¹, Gentur Handoyo¹

¹Departemen Oseanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275

²Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275
Email : aninosi@yahoo.co.id

Abstrak

Fishing ground atau zona penangkapan ikan adalah suatu kawasan perairan yang menjadi sasaran dalam usaha penangkapan ikan. Ikan teri merupakan hasil tangkapan ikan yang populer di Karimunjawa. Penelitian ini bertujuan memprediksi zona tangkapan ikan di Perairan Karimunjawa berdasarkan sebaran klorofil-a dan suhu permukaan laut dengan memanfaatkan data citra satelit Aqua MODIS level-3. Sebaran klorofil-a yang tinggi terlihat pada bulan Mei sampai Juli. Nilai korelasi antara klorofil-a dengan tangkapan ikan di lapangan sebesar $r=0,869$ yang berarti berhubungan sangat erat. Sedangkan nilai korelasi Suhu Permukaan Laut (SPL) dengan tangkapan ikan hanya sebesar $r=0,387$. Hal ini berarti hasil tangkapan ikan teri di Kepulauan Karimunjawa lebih dipengaruhi oleh sebaran klorofil-a dari pada SPL. Oleh karena itu dalam penentuan potensi *fishing ground* dengan menggunakan data MODIS klimatologi bulanan, kami hanya menggunakan parameter klorofil-a. Perairan Karimunjawa memiliki kandungan klorofil-a rata rata sebesar $0,29 \text{ mg/m}^3$. Berdasarkan analisa sebaran klorofil-a klimatologi bulanan, lokasi potensi *fishing ground* berada pada barat dan tenggara dari perairan Pulau Nyamuk, Barat Pulau Kemujan termasuk Pulau Cemara Besar dan Kecil, dan di perairan sekitar Pulau Parang yang dapat ditemukan disetiap bulannya.

Kata kunci: *Fishing ground*, Ikan Teri, Citra MODIS

Abstract

Anchovy Ground Fishing Identification (Stolephorus sp) Using Fashionable Images in the Waters of Karimunjawa, Jepara

Fishing ground or fishing zone is an area in the ocean which becomes a target for fishing activities. Common target for fishing activity in Karimunjawa is anchovy. The aim of this study is to predict fishing zone on the waters of Karimunjawa based on the chlorophyll distribution and sea surface temperature by utilizing level 3 Aqua MODIS data. The high chlorophyll-a distribution is observed from May to July. The correlation value between chlorophyll-a and fish catch based on insitu data is strong with $r = 0.869$. Conversely, the correlation between insitu SPL correlation and fish catch is weak with $r = 0.38$. Therefore, we only used chlorophyll-a parameter to determine the potential fishing ground in Karimunjawa. Karimunjawa waters have an average chlorophyll-a concentration of 0.29 mg/m^3 . Based on monthly climatology of MODIS chlorophyll data, the location of potential fishing ground is west and southeast from the waters of the island of Nyamuk, the west of Kemujan Island including Pulau Cemara Besar and Kecil, and in the waters around Parang Island which can be found every month.

Keywords: *Fishing Ground*, Anchovy, Aqua MODIS

PENDAHULUAN

Zona tangkapan ikan (*Fishing Ground*) adalah suatu daerah atau lokasi sasaran untuk menangkap ikan di perairan laut. Salah satu ciri

fishing ground yaitu terdapat banyak gerombolan ikan didalamnya (Mursyidin *et al.*, 2015). Ikan teri merupakan salah satu target tangkapan nelayan di Kepulauan Karimunjawa. Pada umumnya

*Corresponding author
buloma.undip@gmail.com

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma>

Diterima/Received : 03-10-2018
Disetujui/Accepted : 23-10-2018

nelayan tradisional di Karimunjawa di dalam menentukan zona tangkapan masih berdasarkan pengalaman dan kemampuan panca indra saja. Nelayan Karimunjawa mayoritas masih menggunakan cara-cara konvensional untuk menangkap ikan yaitu dengan mengandalkan pengalaman dengan pemanfaatan panca indra (Saifudin *et al.*, 2014). Oleh karena itu hasil tangkapan nelayan tradisional Karimunjawa biasanya fluktuatif berdampak pada kesejahteraan nelayan itu sendiri.

Banyaknya ikan yang ada di lokasi zona tangkapan ikan dapat diketahui melalui parameter oseanografi di perairan tersebut. Parameter oseanografi perairan yang digunakan untuk mendeteksi adanya *fishing ground* adalah Suhu Permukaan Laut (SPL) dan Klorofil-a (Mursyidin *et al.*, 2015). Kriteria suatu perairan dikategori sebagai zona *fishing ground* adalah memiliki nilai kandungan konsentrasi klorofil-a $>0.2 \text{ mg/m}^3$ dan SPL yang ideal untuk penentuan potensi tangkapan ikan pelagis kecil berkisar antara $29^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$ (Kunarsa, 2005).

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknologi citra satelit Aqua MODIS untuk membantu menentukan daerah potensi *fishing ground* bagi nelayan tradisional setempat. Citra Aqua MODIS menghasilkan data data tentang parameter penggunaan citra satelit Aqua MODIS adalah datanya sudah berupa produk sehingga data tersebut dapat langsung diolah dan juga dapat mencakup luasan daerah penelitian yang sangat luas dan dalam waktu yang singkat. Kami menguji oseanografi yang berhubungan dengan tangkapan ikan. Keunggulan dari parameter SST dan klorofil-a terhadap hasil tangkapan ikan teri secara *insitu*, dimana hasil analisis data *insitu* tersebut kami gunakan sebagai dasar penentuan zona potensi *fishing ground* dengan menggunakan data citra MODIS. Jadi, penelitian ini menggunakan kombinasi data lapangan (klorofil-a, SPL, tangkapan ikan) dengan data citra satelit klorofil-a Aqua MODIS untuk menentukan daerah *fishing ground*.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan faktor oseanografi (SPL dan Klorofil-a) dengan tangkapan ikan teri, menentukan daerah *Fishing Ground* Ikan Teri dengan menggunakan citra satelit aqua MODIS dan meneliti faktor yang mempengaruhi variabilitas parameter oseanografi di perairan Karimunjawa

MATERI DAN METODE

Materi yang digunakan dalam penelitian


ini terdiri dari data klorofil-a, dan SPL, didapat secara *insitu*. Selain itu juga digunakan data klorofil-a dan SPL didapat dari citra satelit yang diunduh dari website www.oceancolour.nasa.gov dengan resolusi 4 Km dan waktu perekaman Januari 2011 sampai Desember 2016. Produk MODIS klorofil-a diproduksi dengan menggabungkan dua algoritma, yaitu algoritma rasio band O'Reilly [Ocx] (O'Reilly *et al.*, 1998) dan algoritma indeks warna [CI] (Hu, 2012). Algoritma CI dan Ocx digunakan untuk pengambilan klorofil-a masing-masing di bawah $0,15 \text{ mg/m}^3$ dan di atas $2,0 \text{ mg/m}^3$. Di antara nilai-nilai ini, keduanya algoritma dicampur dengan metode pembobotan. Sedangkan untuk MODIS SPL 11 μm dihasilkan oleh algoritma Multichannel SPL dengan menggunakan suhu kecerahan pada 11 μm dan 12 μm (Brown dan Minnett, 2009).

Data MODIS ini dikembangkan dan didistribusikan oleh National AS Aeronautika dan Administrasi Luar Angkasa (NASA) dan the Ocean Biology Processing Group. MODIS adalah platform operasional penginderaan warna laut dan juga banyak digunakan untuk investigasi fenomena oseanografi di laut. Data ini juga telah diuji dan divalidasi terhadap pengukuran *in situ* untuk memastikan yang terbaik akurasi. (Moore *et al.*, 2009) dan (Zhang *et al.*, 2006).

Data penunjang yang digunakan adalah data angin Karimunjawa dari website www.ecmwf.int dengan resolusi 4 Km dengan data diambil setiap bulan dari Januari 2011 sampai Desember 2016. Penentuan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) yang lokasinya berdasarkan titik daerah penangkapan nelayan setempat dan juga menurut hasil olah citra satelit. Kegiatan pengambilan data di lapangan dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 19 Mei dan 20 Mei 2017 dengan jumlah titik yang diambil sebanyak 11 titik. Peta lokasi penelitian ditampilkan pada Gambar 1.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, pengambilan data citra satelit dan pengambilan data langsung dari lapangan. Pengambilan data di lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi zona tangkapan ikan teri di perairan Karimunjawa setelah itu data citra satelit Aqua MODIS digunakan untuk menentukan daerah *fishing ground*.

Pengukuran SPL, dan Klorofil-a secara *insitu* dalam penelitian ini dilakukan pada saat



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.

kapal nelayan berhenti pada titik yang sudah ditentukan. Setelah kapal berhenti lalu SPL diukur menggunakan alat thermometer air raksa ($^{\circ}\text{C}$), Klorofil-a diambil dalam botol sampel 1 liter (mg/m^3), dan tangkapan ikan diambil selama dua jam per stasiun.

Pengolahan Data Citra

Pengolahan data SPL dan Klorofil- a dilakukan dengan menggunakan berbagai macam *software*. Dilakukan pemotongan citra yang sesuai untuk membatasi wilayah yang diteliti. Data tersebut kemudian di proses untuk menghasilkan output berupa format GeoTIFF, yang selanjutnya hasil tersebut digambarkan secara visual berupa peta suhu permukaan laut dan klorofil-a.

Data angin yang digunakan adalah data angin ECMWF (<http://www.ecmwf.int>). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data setiap bulan dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Parameter yang digunakan untuk mengetahui kecepatan dan arah angin yaitu v dan u . Titik koordinat dimasukkan untuk membatasi wilayah kajian. *Grid* yang dipilih adalah 0,125 karena wilayah kajian Kepulauan Karimunjawa termasuk wilayah yang kecil. Data yang telah diunduh kemudian diekstrak dan dihitung rata-ratanya. Menggunakan rumus resultan untuk menghitung nilai komponen arah (θ) dan kecepatan (v). Setelah di dapat arah dan kecepatannya kemudian di gambarkan secara visual dalam bentuk peta.

Metode Klimatologi

Metode klimatologi yang harus dilakukan adalah menggabungkan semua data klorofil-a bulanan ke dalam klimatologi bulanan untuk melihat distribusi spasial laut selama periode dari 2011 hingga 2016. Menurut Wirasatriya *et al.*, (2017) rumus dalam melakukan penggabungan data klimatologi menggunakan persamaan berikut:

$$\bar{X}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i(x, y, t)$$

Dimana $\bar{X}(x, y)$ adalah nilai rata-rata bulanan atau klimatologi bulanan nilai pada posisi (x, y). $x_i(x, y, t)$ adalah nilai dari data pada (x, y) posisi dan waktu t .

Selanjutnya, n adalah jumlah data dalam 1 bulan dan jumlah data bulanan dalam 1 periode klimatologi (yaitu, dari tahun 2011 hingga 2016) untuk perhitungan bulanan dan perhitungan klimatologi bulanan, masing-masing. Jika x_i adalah lubang pixel, piksel itu dikecualikan dalam perhitungan.

Analisis Klorofil-a

Kandungan klorofil-a di perairan menggunakan panjang gelombang yang berbeda yaitu 647 nm, 630 nm, 665 nm dan 750 nm (APHA, 1992, Riyono & Hadi., 2006, Maslukah *et al.*, 2018). Selanjutnya Konsentrasi klorofil-a dihitung menggunakan formula berikut :

$$Ca = 11.85 (\lambda_{664}) - 1.54 (\lambda_{645}) - 0.08 (\lambda_{630})$$

$$Klo-a (\text{mg}/\text{m}^3) = Ca \times v/V$$

Dimana : λ_{664} , λ_{645} , dan λ_{630} = pembacaan nilai absorbansi pada panjang gelombang tersebut, v = volume ekstrak (liter), V = volume sampel (m^3)

Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2009) analisis korelasi menyatakan derajat keeratan hubungan antar variabel. Pada analisis ini digunakan analisis korelasi bivariate untuk mencari derajat keeratan hubungan antara variabel SPL dengan klorofil-a, SPL dengan angin, Klorofil-a dengan angin, dan semua dengan hasil tangkapan. Semakin tinggi nilai korelasinya maka semakin tinggi pula tingkat keeratan hubungan antar variabel.

Pada analisis korelasi bivariate digunakan pengujian *Pearson* untuk mengetahui hubungan data yang terdistribusi normal dengan menggunakan rumus korelasi *Pearson* menurut Sugiyono (2009).

Nilai dari koefisien korelasi (r) memiliki kisaran antara 0-(-)/1 (Tabel 1). Tanda positif menunjukkan arah hubungan yang searah, sedangkan negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Data Lapangan (Klorofil-a, SPL, Tangkapan Ikan)

Hasil pengolahan data klorofil-a menunjukkan kandungan klorofil-a yang paling rendah terdapat pada stasiun 6 dengan $0,117 \text{ mg/m}^3$ dan kandungan klorofil-a terbesar terdapat pada stasiun 9 dengan $0,575 \text{ mg/m}^3$ (Tabel 2).

Hasil data lapangan klorofil-a dengan tangkapan ikan teri secara spasial ditampilkan pada Gambar 2. Perbedaan warna menunjukkan kandungan klorofil-a dan ukuran lingkaran menunjukkan hasil tangkapan ikan teri. Stasiun 6 memiliki kandungan klorofil-a yang paling rendah dan diikuti hasil tangkapan ikan teri yang juga rendah. Stasiun 10 memiliki kandungan klorofil-a yang sedang ($0,3 \text{ mg/m}^3$) dan diikuti oleh hasil tangkapan ikan teri yang juga sedang

(4kg). Stasiun 11 memiliki kandungan klorofil-a yang paling tinggi ($0,5 \text{ mg/m}^3$) dan diikuti hasil tangkapan ikan teri yang paling banyak (8kg).

Hasil data lapangan klorofil-a dengan tangkapan ikan teri secara statistik ditampilkan pada Gambar 4. Grafik *scatter* antara klorofil-a dengan hasil tangkapan ikan menunjukkan nilai korelasi yang tinggi yaitu dengan nilai $R=0,869$ dengan kata lain nilai tersebut sangat kuat menurut perhitungan *pearson* (Tabel 1). Menurut penelitian dari Prastianto (2016) menyebutkan bahwa proses penyebaran klorofil-a di perairan akan menyebabkan ikan kecil pelagis dan organisme lain berkumpul ke daerah yang memiliki konsentrasi klorofil-a yang tinggi.

Hasil data SPL dengan tangkapan ikan teri secara spasial ditampilkan pada Gambar 3. Stasiun 7 dan 11 memiliki SPL yang berbeda tetapi memiliki hasil tangkapan ikan teri yang sama (1-3kg) dan stasiun 4 dan 9 memiliki SPL yang sama tinggi tetapi berbeda hasil tangkapan ikan terinya. Hasil berupa statistik dari SPL dengan tangkapan ikan teri berupa *scatter* ditampilkan pada Gambar 5. SPL bisa dikatakan tidak memiliki pengaruh banyak terhadap tangkapan ikan teri di lapangan. SPL dan tangkapan ikan memiliki nilai $R= 0,387$ bisa diartikan nilai tersebut rendah menurut perhitungan *pearson* (Tabel 1). Selanjutnya nilai SPL tidak akan dibahas pada penelitian ini karena tidak banyak berpengaruh pada hasil tangkapan ikan menurut hasil penelitian.

Peta Fishing Ground Perairan Karimunjawa

Zona *fishing ground* yang baik menurut (Kunarso, 2005) adalah daerah perairan yang memiliki kandungan klorofil- a $>0,2 \text{ mg/m}^3$ dan SPL untuk ikan pelagis kecil yaitu $29^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$. Perairan Karimunjawa memiliki nilai kandungan klorofil-a yang tinggi dan hampir merata, sehingga jika menggunakan teori dari Kunarso (2005) seluruh perairan Karimunjawa dapat dikategorikan sebagai daerah tangkapan ikan yang potensial.

Berdasarkan pengambilan data lapangan yang dilakukan pada bulan Mei 2017 diketahui bahwa pada stasiun 11 yang terletak pada koordinat $110,441$ dan $-5,808$ memiliki kandungan klorofil-a dan hasil tangkapan ikan teri tertinggi. Menurut data citra satelit Aqua MODIS klimatologi pada bulan Mei di stasiun 11 memiliki kandungan klorofil sebesar $0,77 \text{ mg/m}^3$ dan terendah sebesar $0,2 \text{ mg/m}^3$ dengan kecepatan angin rata rata sebesar $3,7 \text{ m/s}$.

Peta potensi tangkapan ikan ditampilkan pada Gambar 6. Hasil penelitian menunjukkan

Tabel 1. Korelasi Pearson (Sugiyono, 2009)


Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,19	Sangat Rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,59	Agak rendah
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

bahwa daerah potensi tangkapan ikan dibagi menjadi tiga golongan yaitu, rendah, sedang, dan tinggi yang dibagi menurut standar deviasi dengan nilai yang didapat sebesar 0,3. Daerah tangkapan rendah memiliki kandungan klorofil-a $0,1 \text{ mg/m}^3 \leq \text{klorofil-a} \leq 0,3 \text{ mg/m}^3$. Daerah tangkapan yang sedang memiliki kandungan klorofil-a $0,3 \text{ mg/m}^3 \leq \text{klorofil-a} \leq 0,6 \text{ mg/m}^3$. Daerah tangkapan yang tinggi memiliki kandungan klorofil-a sebanyak $0,6 \text{ mg/m}^3 \leq \text{klorofil-a} \leq 1 \text{ mg/m}^3$. Konsentrasi klorofil-a tertinggi terjadi pada bulan Mei-Agustus


dengan rerata sebesar $3,6 \text{ mg/m}^3$ (Gambar 6). Tingginya konsentrasi klorofil-a tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kecerahan perairan, dangkalnya perairan disekitar pulau dan peningkatan kecepatan angin. Hembusan angin yang mendorong terjadinya pencampuran mekanik dan peningkatan *flux* nutrisi dengan meningkatkan proses *mixing* secara vertikal dan pendalaman *mixed layer*, akhirnya kondisi ini ideal untuk fitoplankton tumbuh (Wirasatriya *et al.*, 2017).

Tabel 2. Perhitungan Kandungan Klorofil-a di Laboratorium


Stasiun	C	Klorofil-a (mg/m^3)
1	0,02907	0,2907
2	0,02362	0,2362
3	0,022	0,22
4	0,022	0,22
5	0,02362	0,2362
6	0,01177	0,1177
7	0,02038	0,2038
8	0,03385	0,3385
9	0,05755	0,5755
10	0,03547	0,3547
11	0,02208	0,2208




Gambar 2. Peta Hasil Tangkapan Ikan Teri di Lapangan Dihubungkan Dengan Konsentrasi Klorofil-a Pada Titik Yang Sama



Gambar 3. Peta Hasil Tangkapan Ikan Teri di Lapangan Dihubungkan Dengan Suhu Permukaan Laut



Gambar 4. Grafik *scatter* Klorofil-a vs Tangkapan Ikan




Gambar 5. Grafik *scatter* SPL vs Tangkapan Ikan


Klorofil-a yang paling rendah terjadi pada bulan November dengan rerata sebesar $0,2 \text{ mg/m}^3$ (Gambar 6). Rendahnya konsentrasi klorofil-a tersebut diakibatkan oleh lemahnya kecepatan angin, dengan nilai kecepatan rata-rata angin pada bulan tersebut sebesar $1,47 \text{ m/s}$. Lemahnya kecepatan angin menjadikan proses *mixing* juga melemah sehingga

proses penyuburan perairan menjadi rendah.

Hasil prediksi daerah tangkapan ikan yang termasuk potensial (kategori sedang-tinggi) ada di beberapa tempat, yaitu barat dan tenggara dari perairan Pulau Nyamuk, Barat Pulau Kemujan termasuk Pulau Cemara Besar dan Kecil, dan di perairan sekitar Pulau Parang. Penentuan lokasi *fishing ground*



Gambar 6 a. Peta Klimatologi Bulanan Klorofil-a dan Potensi *Fishing Ground* Ikan Teri Di Perairan Karimunjawa Pada Bulan Januari-Juni.



Gambar 6 b. Peta Klimatologi Bulanan Klorofil-a dan Potensi *Fishing Ground* Ikan Teri Di Perairan Karimunjawa Pada Bulan Juli-Desember.


berdasarkan kandungan klorofil-a di daerah tersebut lebih tinggi dari daerah lain. Konsentrasi klorofil-a yang baik digunakan untuk menentukan *fishing ground* adalah $> 0,2 \text{ mg/m}^3$ (Kunarto, 2005).

Distribusi Temporal Klorofil-a, Angin Secara Bulanan di Perairan Karimunjawa


Grafik sebaran klorofil-a dan angin secara temporal ditampilkan pada Gambar 7 dan Gambar 8. Data klorofil-a menggunakan data citra Aqua MODIS dan data angin menggunakan

ECMWF bulanan selama enam tahun. Menurut penelitian dari Wirasatriya *et al.*, (2017) menyebutkan bahwa klorofil-a di area perairan terbuka memiliki korelasi positif terhadap kecepatan angin (Gambar 7 dan Gambar 8).

Klorofil-a terlihat berubah-ubah setiap bulannya dan juga pola arah angin juga berubah menurut musimnya. Rerata klorofil-a tertinggi terlihat pada Bulan Juni ($0,41 \text{ mg/m}^3$) dengan arah angin menuju ke Barat Laut sebesar $4,01 \text{ m/s}$, dan rerata klorofil-a terendah pada Bulan November ($0,17 \text{ mg/m}^3$) dengan pola arah



Gambar 7. Grafik Angin dan Klorofil-a Bulanan Selama Enam Tahun



Gambar 8. Grafik Angin dengan Klorofil-a Klimatologi Bulanan Selama Enam Tahun.

angin menuju ke Barat Laut sebesar 1,54 m/s.

Distribusi angin bulanan di perairan Karimunjawa memiliki nilai tertinggi pada Bulan Januari (5,9 m/s) dan Agustus (5,6 m/s), sedangkan nilai terendah pada Bulan April (1,03 m/s) dan November (1,5 m/s). Bila diamati sebaran klorofil-a di perairan Karimunjawa itu merata dan konstan dengan klorofil-a rata rata bernilai 0,28 mg/m³. Tinggi rendahnya kandungan klorofil-a di perairan dapat disebabkan oleh adanya angin, semakin tinggi kecepatan angin maka akan mengakibatkan meningkatnya proses *mixing* diperairan, *mixing* ini dapat meningkatkan juga produksi primer diperairan sehingga organisme pemakan plankton akan berkumpul di daerah tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya semakin lemah kecepatan angin maka akan melemah juga proses *mixing* di perairan, sehingga mengakibatkan lemahnya produktivitas primer di perairan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hubungan korelasi antara klorofil-a dengan tangkapan ikan teri

menunjukkan sangat erat dengan nilai r sebesar 0,869. Sedangkan hubungan korelasi antara SPL dengan tangkapan ikan teri menunjukkan nilai rendah dengan r sebesar 0,387, yang mengindikasikan SPL tidak berpengaruh besar terhadap hasil tangkapan ikan teri. Berdasarkan analisis dari MODIS klorofil-a secara spasial *Fishing Ground* ikan teri yang potensial berada pada bagian barat dan tenggara perairan Pulau Nyamuk, Barat Pulau Kemujan termasuk perairan Pulau Cemara Besar dan Kecil, dan di perairan sekitar Pulau Parang. Sedangkan secara temporal, kandungan rerata klorofil-a tertinggi terdapat pada bulan Juni (0,4 mg/m³) dan terendah terdapat pada bulan November (0,17 mg/m³). Distribusi klorofil-a di perairan Karimunjawa dipengaruhi oleh angin, dengan korelasi sebesar $r=0,71$

DAFTAR PUSTAKA

APHA. 1992. Standart method for the examination of water dan wastewater. 18th edition. Washington, 252p

- Brown, O.B. & Minnett, P.J., 2009. MODIS infrared sea surface temperature algorithm theoretical basis document, Version 2.0.
- Hu, C., Lee, Z. & Franz, B., 2012. Chlorophyll a algorithms for oligotrophic oceans: A novel approach based on three-band reflectance difference, *J. Geophys. Res.*, 117(C01011): 1–25. DOI: 10.1029/2011jc007395.
- Kunarso. 2005. Kajian Penentuan Lokasi- Lokasi Upwelling Di Perairan Indonesia dan Sekitarnya Serta Kaitannya Dengan Fishing Ground tuna. [Thesis]. PS.Oseanografi, Saints Atmosfir dan Seismologi, ITB, Bandung, Hlm 250.
- Maslukah, L., Wulandari, S. Y., Prasetyawan, I.B. & Muslim. 2018. The Distributions Of N, P Nutrients And Its Relations with Chlorophyll-a : Case Study In Serang And Wiso Estuary, Jepara, Indonesia. *Asian J. Microbiol. Biotechnol. Environ. Sci.* 20(3): 123-129.
- Moore, T.S., Campbell, J.W. & Dowell, M.D., 2009. A. class-based approach to characterizing and mapping the uncertainty of the MODIS ocean chlorophyll product. *Remote. Sens. Environ.* 113:2424–2430.
- Mursyidin, Munadi, K., & Muchlisin, Z.A. 2015. Prediksi Zona Tangkapan Ikan Menggunakan Citra Klorofil-a dan Citra Suhu Permukaan Laut Satelit Aqua MODIS di Perairan Pulo Aceh. *J. Rekayasa Elektrika.* 11(5):176-182
- O'Reilly, J.E., Maritorena, S., Mitchell, B.G., Siegel, D.A., Carder, K.L., Garver, S.A. & Kahru, M., McClain, C. 1998. Ocean color chlorophyll algorithms for SeaWiFS, *Geophys. Res. Letters.* 103:24937–24953
- Riyono & Hadi, S., 2006. Beberapa Metode Pengukuran Klorofil Fitoplankton di Laut. *Jurnal Oseana.* XXXI(3):33-34.
- Saifudin, Fitri, A.D.P., & Sardiyatmo. 2014. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (GIS) Dalam Penentuan Daerah Penangkapan Ikan Teri (*stolephorus sp*) di Perairan Pemalang Jawa Tengah. *J. Fish. Res. Utilization Manag. Technol.* 3(4):66-75.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, dan R and D. Alfabeta, Bandung, hlm 380.
- Wirasatriya, A., Prasetyawan, I.B, Triyono, C.D., Muslim & Maslukah, L., 2017. Effect Of ENSO On The Variability Of SST And Chlorophyll-A In Java Sea. 3rd International Conference On Tropical And Coastal Region Eco-Development 2017, *IOP Conferen. Ser. : Earth Environ. Sci.* 116:012063
- Wirasatriya, A., Setiawan, R.Y., & Subardjo, P., 2017. Effect Of Enso On The Variability of Chlorophyll-A And SPL In The Maluku Sea. *IEEE J. Selec. Topics App. Earth Observ. Remote Sens.* 10:5513-5518
- Zhang, C., Hu, C., Shang, S., Karger, F.E.M., Li, Y., Dai, M., Huang, B., Ning, X. & Hong, H. 2006. Bridging between SeaWiFS and MODIS for continuity of chlorophylla concentration assessments off Southeastern China, *Remote Sens. Environ.* 102:250–263.

Identifikasi Fishing Ground Ikan Teri (Stolephorus sp) Menggunakan Citra Modis di Perairan Karimunjawa, Jepara

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1

J. Ch. Kumaat, M. M. F. Rampengan, S. T. B. Kandoli. "Geographic Information System for Tuna Fishing Areas in Bitung waters", JURNAL ILMIAH PLATAX, 2018
Publication

1 %
- 2

Muhamad Bob Anthony. "Pengaruh Budaya 5R dan Kinerja Karyawan terhadap Lingkungan Kerja di Sinter Plant PT.XYZ", Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri, 2020
Publication

1 %
- 3

Umar Tangke, Sitkun Deni. "Pemetaan daerah penangkapan ikan madidihang (Thunnus albacares) dan ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) di Perairan Maluku Utara", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2013
Publication

1 %
- 4

Hotma Stefany Sitorus, Lusia Manu, Frangky E Kaparang, Heffry V Dien. "Determination of Potential Pelagic Fishing Ground Based on

1 %

Chlorophyll a Using Aqua Modis Satellite", Jurnal Ilmiah PLATAX, 2022

Publication

5

Aisyah Bafagih, Sahriar Hamzah, Umar Tangke. "Distribution of chlorophyll-a concentration with the catch of julung fish in Ternate Island city", Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2018

Publication

<1 %

6

PAUL D. MOSKOWITZ. "ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY ISSUES RELATED TO THE PRODUCTION AND USE OF CdTe PHOTOVOLTAIC MODULES", International Journal of Solar Energy, 1992

Publication

<1 %

7

Lilik Maslukah, Muhammad Zainuri, Anindya Wirasatriya, Siti Maisyarah. "The Relationship among Dissolved Inorganic Phosphate, Particulate Inorganic Phosphate, and Chlorophyll-a in Different Seasons in the Coastal Seas of Semarang and Jepara", Journal of Ecological Engineering, 2020

Publication

<1 %

8

Arham Rumpa, Muhammad maskur, Fajar Hermawan, Amir Yusuf. "Pemetaan Zona Daerah Penangkapan Ikan Dengan Bagan

<1 %

Perahu Cungkil Berdasarkan Time Series Pada Perairan Teluk Bone", Jurnal Airaha, 2021

Publication

9

Arip Rahman, Lismining Pujiyani Astuti, Andri Warsa, Agus Arifin Sentosa. "PREDIKSI TINGKAT KEKERUHAN (TURBIDITAS) MENGGUNAKAN CITRA SATELIT SENTINEL-2A DI WADUK JATILUHUR, JAWA BARAT", JURNAL SUMBER DAYA AIR, 2021

<1 %

Publication

10

B. Barone, R. M. Letelier, K. H. Rubin, D. M. Karl. "Satellite detection of a massive phytoplankton bloom following the 2022 submarine eruption of the Hunga Tonga–Hunga Haʻapai volcano", Geophysical Research Letters, 2022

<1 %

Publication

11

Nurfauzi Ahmad, Diana Hernawati, Diki Muhamad Chaidir. "Diversity of macroalgae diversity in the tidal waters", JPBIO (Jurnal Pendidikan Biologi), 2021

<1 %

Publication

12

Umar Tangke. "Parameter populasi dan tingkat eksploitasi ikan tongkol (Euthynnus affinis) di perairan Pulau Morotai", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2014

<1 %

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Identifikasi Fishing Ground Ikan Teri (Stolephorus sp) Menggunakan Citra Modis di Perairan Karimunjawa, Jepara

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10