

HIMPUNAN BILANGAN BULAT NON NEGATIF PADA SEMIRING LOKAL DAN SEMIRING FAKTOR

by Nikken Prima Puspita

Submission date: 12-Apr-2023 03:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2062378996

File name: 9._Himpunan_Bilangan_Bulat_Non_Negatif.pdf (53.49K)

Word count: 2383

Character count: 14731

HIMPUNAN BILANGAN BULAT NON NEGATIF PADA SEMIRING LOKAL DAN SEMIRING FAKTOR

Meryta Febrilian Fatimah¹, Nikken Prima Puspita², Farikhin³
^{1,2,3}Jurusan Matematika FSM Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Semarang 50275

Abstract. Let commutative Semiring S . Ideal on Semiring S defined in the same way with the Ideal on the ring. On Semiring there are special Ideals such as π -ideal, π -maximal Ideal and π -ideal. Semiring with a unique π -maximal Ideal is called local Semiring. In This paper we will discussed that from non negative integer we can determined a local Semiring and quotient Semiring.

Keywords : Commutative Semiring, π -ideal, π -maximal Ideal, π -ideal, local Semiring, quotient Semiring

1. PENDAHULUAN

Konsep Semiring diperkenalkan oleh H. S. Vandiver pada tahun 1935. [1] telah membahas tentang salah satu Ideal pada Semiring yaitu Ideal subtraktif. Penelitian terus berkembang hingga pada tahun 2008 [2, 3] penelitian yang menghasilkan konsep tentang Ideal pada Semiring komutatif, Semiring lokal dan Semiring faktor.

Dalam Struktur Aljabar yang dapat dipelajari pada [4, 5, 6] telah diketahui bahwa himpunan bilangan bulat (\mathbb{Z}) terhadap operasi penjumlahan (+) dan perkalian (\cdot) merupakan Ring. Sedangkan himpunan bilangan bulat non negatif (\mathbb{Z}^+) terhadap operasi penjumlahan (+) dan perkalian (\cdot) merupakan Semiring. Pada tulisan ini akan dihubungkan bagaimana konsep semiring yang telah dikemukakan oleh Reza Ebrahimi Atani dan Shahabaddin Ebrahimi Atani kedalam himpunan bilangan bulat non negatif (\mathbb{Z}^+) .

2. PEMBAHASAN

2.1 Ideal atas Semiring Komutatif

Untuk dapat memahami tentang konsep semiring lokal dan semiring faktor, terlebih dahulu dipelajari mengenai ideal yang ada pada semiring sebagai mana diberikan dalam bagian berikut.

Definisi 2.1 [2] Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$. Himpunan tak kosong I dari

Semiring R disebut Ideal jika $a, b \in I$ dan $a + b \in I$ dan $ra \in I$.

Berdasarkan Definisi 2.1 untuk setiap $a \in I$, himpunan $\{ra \mid r \in R\}$ adalah Ideal pada $(R, +, \cdot)$ [2]. Himpunan $\{ra \mid r \in R\}$ dapat ditulis dengan notasi $\langle a \rangle$.

Definisi 2.2 [2] Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$. Ideal subtraktif (k -ideal) I adalah Ideal di R dengan syarat untuk setiap $a \in I$ dengan $a + a \in I$, maka $a \in I$. Berdasarkan Definisi 2.4 untuk setiap $a \in I$, himpunan $\{ra \mid r \in R\}$ merupakan k -ideal pada $(R, +, \cdot)$. Himpunan $\{0\}$ merupakan k -ideal pada $(R, +, \cdot)$.

Berikut diberikan definisi dari k -closure.

Definisi 2.3 [2] Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$ dan Ideal I atas R . Himpunan k -closure I ($cl(I)$) didefinisikan sebagai

$$cl(I) = \{a \in R \mid a + a = a, a \in I\}$$

Berikut ini diberikan sifat terkait k -closure I merupakan Ideal di R .

Sifat 2.4 [2] Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$ dan I Ideal di R . Himpunan $cl(I)$ merupakan Ideal di R .

Bukti :

Diberikan himpunan

$$cl(I) = \{a \in R \mid a + a = a, a \in I\}.$$

Dibuktikan $cl(I)$ adalah Ideal di R .

- a. Himpunan $(\) \neq \emptyset$, sebab terdapat $0 \in$ sehingga $0 + 0 = 0$ untuk suatu $0 \in$, jadi $0 \in (\)$. Terbukti bahwa himpunan $(\) \neq \emptyset$.
- b. Himpunan $(\) \subseteq$, sebab untuk setiap $\in (\)$, maka dari definisi $(\)$ yaitu untuk \in dengan $+ =$ untuk suatu $, \in \subseteq$.
- c. Diambil sebarang $, \in (\)$, sehingga $+ =$, untuk suatu $, \in$ dan $+ =$, untuk suatu $, \in$ diperoleh
- $$+ + + = + +$$
- untuk suatu $, , \in$. Oleh karena I Ideal, maka $+ \in$ dan $+ \in$. Jadi $+ + =$ untuk suatu $= +$, $= +$. Hal ini berakibat $+ \in (\)$. Untuk setiap \in diperoleh $. + . =$. dan karena $, \in$ dan adalah Ideal, maka $, \in$. Berakibat bahwa $. \in (\)$.

Dari (a) – (c) terbukti bahwa $(\)$ Ideal di R .

Beberapa sifat-sifat yang terkait dengan himpunan k -closure dijelaskan sebagai berikut :

Sifat 2.5 [2] Diberikan Semiring $(, +, \cdot)$ dan I Ideal di R . Himpunan $(\)$ memenuhi

- i. $\subseteq (\)$,
- ii. $(\) = (\)$

Bukti :

- i. Dibuktikan $\subseteq (\)$
Diambil sebarang \in . Berdasarkan Definisi 2.3 jelas bahwa $\subseteq (\)$.
- ii. Dibuktikan $(\) = (\)$, yaitu $(\) \subseteq (\)$ dan $(\) \subseteq (\)$.
 - a. Jelas bahwa $(\) \subseteq (\)$, sebab untuk setiap $\in (\)$ dan dari bagian (i) diketahui $\subseteq (\)$, terbukti bahwa $\in (\)$.
 - b. Dibuktikan $(\) \subseteq (\)$
Diketahui $\in (\)$ yaitu $+ =$, untuk suatu $, \in (\)$. Berdasarkan Definisi 2.3 diperoleh

$$+ =$$

$$+ + + = + +$$

(sifat komutatif penjumlahan) dari Definisi 2.3 terbukti bahwa $\in (\)$.

Dari (a) dan (b) terbukti bahwa $(\) = (\)$.

Pada Sifat 2.5 dijelaskan bahwa $\subseteq (\)$. Berikut diberikan syarat perlu dan cukup agar terpenuhi sifat $= (\)$.

Sifat 2.6 [2] Diberikan Semiring $(, +, \cdot)$ dan I Ideal di R . Ideal I adalah k -ideal jika dan hanya jika $= (\)$.

Bukti dapat dilihat pada [2].

Sama halnya dengan Ring, pada Semiring juga dikenal Ideal maksimal dan Ideal Prima [2]. Berikut diberikan definisinya.

Definisi 2.7 [2] Diberikan Semiring $(, +, \cdot)$. Ideal I dari R dikatakan maksimal jika terdapat J Ideal di R dengan $\subseteq \subseteq$ berakibat $=$ atau $=$.

Berdasarkan Definisi 2.7 himpunan 2 merupakan Ideal maksimal pada Semiring $(, +, \cdot)$. Diberikan definisi $-$ ideal maksimal sebagai berikut.

Definisi 2.8 [2] Diberikan Semiring $(, +, \cdot)$. Ideal I dari R dikatakan k - ideal maksimal jika terdapat J k -ideal di R dengan $\subseteq \subseteq$ berakibat $=$ atau $=$.

Berdasarkan Definisi 2.8 himpunan 2 yang merupakan $-$ ideal pada Semiring $(, +, \cdot)$ merupakan $-$ ideal maksimal. Selanjutnya di dalam Semiring terdapat konsep Ideal partisi dinotasikan dengan Q -Ideal.

Definisi 2.9 [7] Diberikan Semiring $(, +, \cdot)$ dan I Ideal pada R . Ideal I disebut Ideal partisi (Q -ideal) asalkan

- i. himpunan \subseteq sedemikian sehingga $= \{ + \mid \in \}$,
- ii. untuk setiap $, \in$, berlaku $(+) \cap (+) = \emptyset$ untuk \neq .

Berdasarkan Definisi 2.9 diberikan contoh sebagai berikut.

Contoh 2.10

Diberikan Semiring $(, +, \cdot)$ dan \in , $\neq 0$. Himpunan $\langle \ \rangle = \{ \mid \in \}$

merupakan Q -ideal pada $(R, +, \cdot)$.
Diketahui bahwa himpunan

$$\langle I \rangle = \{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$$

merupakan Ideal di $(R, +, \cdot)$. Ideal $\langle I \rangle$ adalah Q -ideal pada $(R, +, \cdot)$, sebab terdapat $1 \in \langle I \rangle$ dimana $1 = \sum_{i=1}^n r_i a_i$ sehingga

(i.) untuk setiap $a \in R$ dapat dibentuk himpunan, $a + \langle I \rangle = \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$. Ditunjukkan bahwa $a + \langle I \rangle \subseteq \langle I \rangle$.

a. Himpunan $a + \langle I \rangle \neq \emptyset$, paling tidak terdapat $0 = \sum_{i=1}^n r_i a_i \in \langle I \rangle$ sehingga $a + \langle I \rangle = \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \} = a + \langle I \rangle$.

b. Himpunan $a + \langle I \rangle \subseteq \langle I \rangle$, sebab untuk setiap $\sum_{i=1}^n r_i a_i \in \langle I \rangle$ dan $a \in R$ dengan menggunakan sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan di $(R, +, \cdot)$ diperoleh $a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \in \langle I \rangle$.

c. Ditunjukkan bahwa himpunan $\{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \} \subseteq \langle I \rangle$. Diambil sebarang $a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \in \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$, karena $a \in R \subseteq R$, $\sum_{i=1}^n r_i a_i \in \langle I \rangle$ dan berlaku operasi tertutup terhadap penjumlahan di $(R, +)$. Sehingga diperoleh $a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \in \langle I \rangle$. Terbukti himpunan $\{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \} \subseteq \langle I \rangle$.

d. Ditunjukkan bahwa himpunan $\langle I \rangle \subseteq \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$. Diambil sebarang $\sum_{i=1}^n r_i a_i \in \langle I \rangle$, ditunjukkan bahwa $\sum_{i=1}^n r_i a_i \in \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$.

i. Jika $0 \leq \sum_{i=1}^n r_i a_i \leq -1$, maka untuk setiap

$$\{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \} \in$$

$$\{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$$

dengan $\sum_{i=1}^n r_i a_i = \{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid 0 \leq \sum_{i=1}^n r_i a_i \leq -1 \}$ diperoleh

$$= a + \langle I \rangle$$

$$= a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \text{ untuk suatu } r_i \in R$$

$$= a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \cdot 0 \text{ untuk } \sum_{i=1}^n r_i a_i = 0 \in \langle I \rangle$$

$$=$$

Oleh karena $\sum_{i=1}^n r_i a_i \in \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$, untuk $\sum_{i=1}^n r_i a_i = 0 \in \langle I \rangle$ diperoleh

$$= \sum_{i=1}^n r_i a_i \in \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}.$$

ii. Jika $\sum_{i=1}^n r_i a_i = 0$, maka terdapat $\sum_{i=1}^n r_i a_i = 0 \in \langle I \rangle$ sedemikian sehingga

$$= 0 + \langle I \rangle$$

$$= \langle I \rangle \text{ untuk suatu } r_i \in R$$

$$\in \langle I \rangle = \sum_{i=1}^n r_i a_i \text{ untuk } r_i \in R$$

$$= 1 \in \langle I \rangle, \text{ maka } \langle I \rangle = R$$

Oleh karena $\sum_{i=1}^n r_i a_i \in \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$, untuk $\sum_{i=1}^n r_i a_i = 0 \in \langle I \rangle$ diperoleh $\sum_{i=1}^n r_i a_i = \sum_{i=1}^n r_i a_i$.

iii. Jika $\sum_{i=1}^n r_i a_i > 0$, maka terdapat $(-\sum_{i=1}^n r_i a_i) \in \langle I \rangle$, dimana $(-\sum_{i=1}^n r_i a_i) \leq -1$ dan $(-\sum_{i=1}^n r_i a_i) \geq 0$ sedemikian sehingga

$$= (-\sum_{i=1}^n r_i a_i) + \langle I \rangle$$

$$= (-\sum_{i=1}^n r_i a_i) + \langle I \rangle \text{ untuk}$$

setiap $r_i \in R$

Oleh karena $(-\sum_{i=1}^n r_i a_i) \in \langle I \rangle$, berakibat

$$\{ (-\sum_{i=1}^n r_i a_i) + \langle I \rangle \} \subseteq$$

$$\{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$$

$$\text{sehingga } (-\sum_{i=1}^n r_i a_i) + \langle I \rangle \subseteq$$

$$\{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}.$$

Dari (i) - (iii) terbukti bahwa $\langle I \rangle \subseteq \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$.

Dari (a) - (d) terbukti bahwa $\langle I \rangle = \{ a + \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$.

(ii.) Untuk setiap $a, b \in R$, $(a + \langle I \rangle) \cap (b + \langle I \rangle) = \emptyset$ untuk $a \neq b$.

Diambil sebarang $a, b \in R$, dengan $(a + \langle I \rangle) \cap (b + \langle I \rangle) = \emptyset$,

dibuktikan $a \neq b$. Andaikan $a = b$,

maka dari sifat tertutup penjumlahan di $(R, +)$, $a + \langle I \rangle = b + \langle I \rangle$ sehingga diperoleh

$$(a + \langle I \rangle) \cap (b + \langle I \rangle) = (a + \langle I \rangle) \cap (a + \langle I \rangle)$$

$$= (a + \langle I \rangle) \cap (a + \langle I \rangle) = (a + \langle I \rangle)$$

Kontradiksi dengan $(a + \langle I \rangle) \cap (b + \langle I \rangle) = \emptyset$. Pengandaian salah,

maka haruslah $a \neq b$.

Dari (i) dan (ii) terbukti bahwa himpunan $\langle I \rangle = \{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \}$ merupakan Q -ideal di $(R, +, \cdot)$.

2.2 Semiring Lokal

Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$ dengan elemen satuan 1 . Setiap $e \in R$ dengan

$e \neq 0$ disebut semi-unit di R jika terdapat $a, b \in R$ sedemikian sehingga $1 + e =$

. Ideal merupakan ideal pada Semiring $(R, +, \cdot)$ jika dan hanya jika $a \in I$ dan $b \in I$ maka $a + b \in I$ dan $ra \in I$ untuk setiap $r \in R$.

Lemma 2.11 [2] *Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$ dengan elemen satuan dan k-ideal I di R , pernyataan berikut dipenuhi.*

- (i.) Jika a adalah semi-unit di R dengan $a \in I$, maka $a^{-1} \in I$.
- (ii.) Untuk setiap $a \in I$, maka $\langle a \rangle$ adalah k-ideal dari R .

Bukti dapat dilihat pada [2].

Berikut ini diberikan lemma tentang k-ideal maksimal pada Semiring $(R, +, \cdot)$.

Lemma 2.12 [2] *Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$ dengan elemen satuan. Paling tidak terdapat satu k-ideal maksimal di R .*

Bukti :

Dibentuk himpunan $\mathcal{I} = \{ I \mid I \text{ adalah k-ideal di } R \}$. Himpunan tak kosong, sebab himpunan $\{0\}$ adalah k-ideal di R , jadi $\{0\} \in \mathcal{I}$. Himpunan merupakan himpunan terurut parsial terhadap relasi \subseteq yaitu $I \sim J \iff I \subseteq J$ untuk setiap $I, J \in \mathcal{I}$. Akibatnya, pasangan (\mathcal{I}, \subseteq) merupakan himpunan terurut parsial. Dengan menggunakan Lemma Zorn jika dibentuk rantai naik di \mathcal{I} yaitu $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$ yang merupakan Ideal-Ideal di R , maka terdapat dengan tunggal sehingga $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$. Dengan kata lain I adalah k-ideal maksimal di R .

Selanjutnya, diberikan definisi Semiring lokal sebagai berikut.

Definisi 2.13 [2] *Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$. Semiring R disebut Semiring lokal asalkan R memiliki k-ideal maksimal yang tunggal.*

Berikut ini diberikan Teorema yang berkaitan dengan k-ideal maksimal pada sebuah Semiring yang dibangun oleh elemen-elemen yang berhingga.

Teorema 2.14 [1] *Diberikan Semiring $(R, +, \cdot)$ dengan $S = \{ s_1, s_2, \dots, s_n \}$ merupakan Semiring yang dibangun secara berhingga. Jika A merupakan k-ideal di R , maka A termuat dalam suatu k-ideal maksimal di R .*

Bukti :

Diketahui merupakan -ideal di $(R, +, \cdot)$. Dibentuk himpunan

$$\Delta = \{ I \mid I \text{ adalah k-ideal di } R, I \not\subseteq A \}$$

Himpunan $\Delta \neq \emptyset$, sebab paling tidak terdapat $I \in \Delta$ yang merupakan -ideal di $(R, +, \cdot)$. Pasangan (Δ, \subseteq) merupakan poset dan dari definisi himpunan Δ , untuk setiap $I, J \in \Delta$ diperoleh $I \subseteq J$ sehingga himpunan Δ akan mmuat batas atas paling tidak adalah R . Kemudian dimisalkan merupakan gabungan semua -Ideal di Δ yang memuat A , dinotasikan dengan $\bigcup_{I \in \Delta} I$ dan $\subseteq R$ untuk setiap $I \in \Delta$. Ditunjukkan merupakan -ideal di $(R, +, \cdot)$. Himpunan merupakan -ideal di $(R, +, \cdot)$, sebab memenuhi aturan berikut:

1. Himpunan Ideal di $(R, +, \cdot)$, sebab jika diambil sebarang $a, b \in I$ artinya bahwa paling tidak terdapat Ideal $J, K \in \Delta$ sedemikian sehingga $a \in J$ dan $b \in K$. Untuk setiap $J, K \in \Delta$, maka terdapat dua kasus yang mungkin yaitu $J \subseteq K$ atau $K \subseteq J$.
 - a. Kasus 1, untuk $J \subseteq K$. Untuk setiap $a, b \in I$, $a \in J$ dan $b \in K$ maka $a + b \in J$ dan untuk setiap $r \in R$ berlaku $ra \in J$.
 - b. Kasus 2, untuk $K \subseteq J$. Untuk setiap $a, b \in I$, $a \in K$ dan $b \in J$ maka $a + b \in K$ dan untuk setiap $r \in R$ berlaku $ra \in K$.
 Dari (a) dan (b) karena $I \subseteq J \cup K$, maka terbukti bahwa Ideal di $(R, +, \cdot)$.
2. Himpunan -ideal di $(R, +, \cdot)$, sebab jika diambil sebarang $a, b \in I$ artinya bahwa paling tidak terdapat -ideal $J, K \in \Delta$ sedemikian sehingga $a \in J$ dan $b \in K$. Untuk setiap $J, K \in \Delta$, maka $J \subseteq K$ atau $K \subseteq J$.
 - a. Kasus 1, untuk $J \subseteq K$. Untuk setiap $a, b \in I$, $a \in J$ dan $b \in K$ maka $a + b \in J$ dan $ra \in J$.
 - b. Kasus 2, untuk $K \subseteq J$. Untuk setiap $a, b \in I$, $a \in K$ dan $b \in J$ maka $a + b \in K$ dan $ra \in K$.

Dari (a) dan (b) karena $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, maka terbukti bahwa \mathcal{A} -ideal di \mathcal{B} . Dari (1) dan (2) diketahui bahwa \mathcal{A} merupakan \mathcal{A} -ideal di \mathcal{B} . Ditunjukkan bahwa $\mathcal{A} \neq \mathcal{B}$. Diketahui $\mathcal{A} \in \Delta$ dan $\Delta \neq \mathcal{A}$. Oleh karena $\Delta \neq \mathcal{A}$, maka $1 \notin \mathcal{A}$. Hal ini berakibat $1 \notin \mathcal{A}$, sehingga $\mathcal{A} \neq \mathcal{B}$. Jadi terbukti bahwa \mathcal{A} merupakan batas atas di Δ dan \mathcal{A} -ideal yang memuat di \mathcal{B} . Dengan kata lain \mathcal{A} merupakan \mathcal{A} -ideal maksimal di \mathcal{B} dan $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. Selanjutnya, diberikan akibat dari Teorema 2.14 sebagai berikut.

Akibat 2.15 [1] *Diberikan Semiring $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ dengan elemen satuan 1. Setiap k -ideal di R termuat dalam suatu k -ideal maksimal di R .*

Bukti dapat dilihat di [1].

Lemma 2.16 [2] *Diberikan Semiring $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ dengan elemen satuan 1 dan $a \in \mathcal{A}$. Elemen a merupakan semi-unit di R jika dan hanya jika a tidak termuat pada setiap k -ideal maksimal di R .*

Bukti :

(\Rightarrow) Diketahui \mathcal{A} merupakan semi-unit di R . Dibuktikan bahwa untuk sebarang \mathcal{A} -ideal maksimal di R , maka $a \notin \mathcal{A}$. Diambil sebarang \mathcal{A} -ideal maksimal di R dan $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, $\mathcal{A} \neq \mathcal{B}$. Andaikan $a \in \mathcal{A}$, karena \mathcal{A} merupakan \mathcal{A} -ideal di \mathcal{B} . Dari Lemma 2.11 (i) diperoleh $\mathcal{A} = \mathcal{B}$, kontradiksi dengan $\mathcal{A} \neq \mathcal{B}$. Pengandaian salah, haruslah $a \notin \mathcal{A}$.

(\Leftarrow) Diketahui $a \notin \mathcal{A}$ dan \mathcal{A} merupakan \mathcal{A} -ideal maksimal di \mathcal{B} . Dibuktikan bahwa \mathcal{A} merupakan semi-unit di \mathcal{B} . Diambil sebarang $\mathcal{A} \in \Delta$ dan $a \notin \mathcal{A}$, andaikan bukan semi-unit di \mathcal{B} maka tidak ada $\mathcal{A} \in \Delta$ sedemikian sehingga $1 + \mathcal{A} = \mathcal{A}$. Berdasarkan Definisi 2.3, berakibat $1 \notin \mathcal{A}$, sebab tidak ada $\mathcal{A} \in \Delta$ sedemikian sehingga $1 + \mathcal{A} = \mathcal{A}$. Dari Lemma 2.11 (ii) diketahui bahwa (\mathcal{A}) merupakan \mathcal{A} -ideal di \mathcal{B} . Oleh karena untuk suatu \mathcal{A} -ideal maksimal di \mathcal{B} dari Teorema 2.14 haruslah (\mathcal{A}) $\subseteq \mathcal{A}$ atau $\mathcal{A} \in (\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}$ sehingga $\mathcal{A} \in \mathcal{A}$. Kontradiksi, dari yang diketahui $a \notin \mathcal{A}$.

pengandaian salah haruslah \mathcal{A} merupakan semi-unit di \mathcal{B} .

Berikut diberikan Teorema pada Semiring lokal.

Teorema 2.17 [2] *Diberikan Semiring $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ dengan elemen satuan 1. Semiring R dikatakan Semiring lokal jika dan hanya jika himpunan dari semua elemen non-semi unit di R adalah k -ideal.*

Bukti :

(\Rightarrow) Dari yang diketahui R dikatakan Semiring lokal asalkan terdapat dengan tunggal P sebagai k -ideal maksimal [2]. Terbukti bahwa P yang merupakan k -ideal maksimal mempunyai elemen-elemen dimana untuk setiap $a \in P$, bukan merupakan semi-unit.

(\Leftarrow) Diberikan himpunan $I = \{a \in R \mid a \text{ bukan semi-unit}\}$ yang merupakan k -ideal di R , maka I adalah k -ideal maksimal [2]. Oleh karena $1 \in R$ dan 1 adalah semi-unit di R , maka $1 \notin I$ atau $1 \notin I$. Semiring R paling tidak memuat satu k -ideal maksimal [2], misalkan J adalah k -ideal maksimal di R , sehingga J memuat elemen-elemen yang bukan unit. Hal ini berakibat $I \subseteq J$ dan $I \neq J$. Oleh karena I adalah k -ideal maksimal dan $I \neq J$, jadi haruslah $I = J$.

2.3 Semiring Faktor

Untuk setiap Ideal I yang merupakan Q -ideal di R dapat dibentuk himpunan

$$= \{ a + I \mid a \in R \}$$

Pada himpunan didefinisikan operasi penjumlahan (\oplus) dan operasi perkalian (\odot) dengan definisi $(a + I) \oplus (b + I) = (a + b) + I$ dan $(a + I) \odot (b + I) = (ab) + I$ dimana $a, b \in R$ adalah elemen tunggal sedemikian sehingga $a + I \neq I$ dan $b + I \neq I$.

dimana $a, b \in R$ adalah elemen tunggal sedemikian sehingga $a + I \neq I$ dan $b + I \neq I$. Selanjutnya pada teorema berikut ditunjukkan bahwa terhadap operasi \oplus dan \odot membentuk struktur Semiring.

Teorema 2.18 [2] *Diberikan Semiring $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ dan I adalah Q -ideal di R . Himpunan \mathcal{A}/I merupakan Semiring*

terhadap operasi penjumlahan (\oplus) dan perkalian (\cdot).

Bukti dapat dilihat pada [2].

2.4 Himpunan Bilangan Bulat Non Negatif pada Semiring Lokal dan Semiring Faktor

Penelitian yang dihasilkan oleh [2] telah dikemukakan pada Bagian 2.1, 2.2 dan 2.3. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana dari himpunan bilangan bulat non negatif diperoleh sebuah semiring faktor dan semiring lokal sebagaimana dijelaskan dalam sifat berikut.

Sifat 2.19 [2] *Semiring* $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ merupakan *Semiring lokal dengan k-ideal maksimal* $\langle\{2,3\}\rangle$

Bukti :

Diketahui bahwa $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan yang dibangun oleh 2 dan 3 atau $\langle\{2,3\}\rangle = \{2 + 3 \mid , \in \}$ merupakan *k-ideal maksimal* tunggal di $(\mathbb{N}, +, \cdot)$.

1. Himpunan $\langle\{2,3\}\rangle \neq \emptyset$. Oleh karena $0 \in$ maka paling tidak ada

$$0 = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \in \langle\{2,3\}\rangle$$

berakibat $\langle\{2,3\}\rangle \neq \emptyset$.

2. Himpunan $\langle\{2,3\}\rangle \subseteq \mathbb{N}$. Diambil sebarang $a = 2 + 3 \in \langle\{2,3\}\rangle$, karena $, \in$ dan berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian serta penjumlahan di $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ berakibat $2, 3 \in$ sehingga diperoleh $2 + 3 = \in$. Jadi, terbukti bahwa himpunan $\langle\{2,3\}\rangle \subseteq \mathbb{N}$.

3. Dibuktikan bahwa himpunan $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan Ideal di \mathbb{N} . Diambil sebarang $, \in \langle\{2,3\}\rangle$ dengan $= 2 + 3$ dan $= 2 + 3$ dimana $, , , \in$, diperoleh

$$\begin{aligned} + &= (2 + 3) + (2 + 3) \\ &= 2 + 2 + 3 + 3 \\ &= 2(+) + 3(+) \end{aligned}$$

(sifat komutatif di $(\mathbb{N}, +)$)

Oleh karena sifat tertutup yang berlaku di $(\mathbb{N}, +)$ dimana untuk setiap $, , , \in$ berlaku $+ = \in$ dan $+ = \in$, maka $2(+) + 3(+) = 2 + 3 \in$

Untuk setiap \in diperoleh

$$\begin{aligned} \cdot &= (2 + 3) \cdot \\ &= 2 \cdot + 3 \cdot \quad (\text{sifat distributif kanan di } (\mathbb{N}, +, \cdot)) \\ &= 2() + 3() \end{aligned}$$

karena untuk setiap $, , \in$ berlaku $, \in$ berakibat

$$2() + 3() \in \langle\{2,3\}\rangle$$

Jadi, terbukti bahwa himpunan $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan Ideal pada $(\mathbb{N}, +, \cdot)$.

4. Dibuktikan bahwa himpunan $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan *k-ideal* di \mathbb{N} . Diambil sebarang $\in \langle\{2,3\}\rangle$ dengan $= 2 + 3$ dimana $, \in$ dan $+ \in \langle\{2,3\}\rangle$. Diketahui $+ \in \langle\{2,3\}\rangle$ atau $+ =$ untuk suatu $= 2 + 3 \in \langle\{2,3\}\rangle$ dengan $, \in$. Dari sifat penjumlahan di diperoleh

$$\begin{aligned} + &= \\ 2 + 3 + &= 2 + 3 \end{aligned}$$

haruslah merupakan bilangan bulat yang dibangun oleh dua dan tiga atau $= 2 + 3$ dengan $, \in$.

Dengan kata lain terbukti bahwa $\in \langle\{2,3\}\rangle$ atau himpunan $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan *k-ideal* di \mathbb{N} .

5. Dibuktikan bahwa himpunan $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan Semiring lokal yaitu himpunan dari semua elemen non-semi unit di adalah *k-ideal*. Dari yang diketahui himpunan $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan *k-ideal* di \mathbb{N} , dibuktikan bahwa jika semi unit di maka $\notin \langle\{2,3\}\rangle$. Diketahui bahwa elemen semi unit di adalah elemen satuan $1, 1 \notin \langle\{2,3\}\rangle$, sebab untuk setiap $, \in$ tidak ada yang memenuhi $2 + 3 = 1$. Jadi, $1 \notin \langle\{2,3\}\rangle$ dan $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan *k-ideal* di \mathbb{N} . Terbukti bahwa himpunan $\langle\{2,3\}\rangle$ merupakan Semiring lokal.

Dari (1) – (5) terbukti bahwa himpunan $\langle\{2,3\}\rangle = \{2 + 3 \mid , \in \}$

merupakan *-ideal maksimal* di \mathbb{N} .

Sifat 2.20 Diberikan Semiring $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ dan Ideal $\langle \rangle$. Dari himpunan $\langle \rangle$ dan $\langle \rangle$ dapat dibentuk Semiring faktor

$$\langle \rangle = \{ + \langle \rangle \mid \in \}$$

dengan

$$= \{ \in \mid 0 \leq \leq - 1 \}.$$

Bukti :

Berdasarkan Contoh 2.10 telah ditunjukkan bahwa $\langle \rangle$ merupakan dengan $= \{ \in \mid 0 \leq \leq - 1 \}$. Hal ini berakibat bahwa dapat dibentuk Semiring faktor

$$\langle \rangle = \{ + \langle \rangle \mid \in \} \quad (\text{Teorema}$$

2.18).

3. PENUTUP

Pembahasan yang telah diuraikan menjelaskan bahwa himpunan bilanganbulat non negatif (\mathbb{N}) merupakan Semiring komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dan dinotasikan dengan $(\mathbb{N}, +, \cdot)$. Semiring $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ merupakan Semiring lokal dimana hanya mempunyai satu \mathbb{N} -ideal maksimal tunggal yaitu Ideal $\langle \{2,3\} \rangle$. Himpunan $\langle \rangle$ merupakan \mathbb{N} -ideal di Semiring $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ dengan $= \{ \in \mid 0 \leq \leq - 1 \}$, sehingga dapat dibentuk Semiring faktor

$$\langle \rangle :$$

4. DAFTAR PUSTAKA

[1] Sen, M. K. and M. R. Adhikari, (1993), On Maximal k -ideals of Semirings. *Proceedings of The American Mathematical Society*. 118(3):699-703.

- [2] Atani, Reza Ebrahimi and Shahabaddin Ebrahimi Atani, (2008), Ideal Theory in Commutative Semirings. *Buletinul Academiei De Stiinte. Republicii Moldova*. 57 (2) : 14-23.
- [3] Atani, Reza Ebrahimi, (2013), Generalizations of Prime Ideals of Semirings. *Azerbaijan Journal of Mathematics*. 3(1) : 76-83.
- [4] Fraleigh, John B., (2003), *A First Course in Abstract Algebra Seventh Edition*. United States of America : Addison Wesley Publishing Company, Inc.
- [5] Gilbert, Linda and Jimmie Gilbert, (2009), *Elements of Modern Algebra Seventh Edition*. United States of America :Cengage Learning.
- [6] Howie, John M., (1995), *Fundamentals of Semigroup Theory*.Skotlandia : Clarendon Press.
- [7] Allen, Paul J., (1969), A Fundamental Theorem of Homomorphisms for Semirings. *Proceedings of the American Mathematical Society*. 21 (2) : 412-416.

HIMPUNAN BILANGAN BULAT NON NEGATIF PADA SEMIRING LOKAL DAN SEMIRING FAKTOR

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	2%
2	repository.usd.ac.id Internet Source	1%
3	Fitriana Hasnani, Nikken Prima Puspita. "IDEAL TAK TEREDUKSI KUAT ATAS SEMIRING KOMUTATIF", Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology, 2022 Publication	1%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	Meryta Febrilian Fatimah, Darmawati Darmawati. "Near-Modul Kuat Faktor", Jambura Journal of Mathematics, 2023 Publication	<1%
7	Algebra, 2015. Publication	<1%

8

Meryta Febrilian Fatimah, Ahmad Ansar.
"KARAKTERISTIK IDEAL PADA SEMINEAR-RING
DAN SEMINEAR-RING SEDERHANA", Proximal:
Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan
Matematika, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

HIMPUNAN BILANGAN BULAT NON NEGATIF PADA SEMIRING LOKAL DAN SEMIRING FAKTOR

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
