

Korelasi Pneumatisasi Mastoid dengan Derajat Destruksi Tulang Pada OMSK Disertai Acquired Cholesteatoma Secara CT-Scan

by Zulfikar Naftali

Submission date: 17-Sep-2021 08:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 1650326285

File name: document.pdf (513.56K)

Word count: 2086

Character count: 12385

**Korelasi Pneumatisasi Mastoid dengan Derajat Destruksi Tulang Pada OMSK Disertai
Acquired Cholesteatoma Secara CT-Scan**

**Correlation of the Mastoid Pneumatization and Bone Destruction in CSOM with
Acquired Cholesteatoma using Computed Tomography**

Dyah Nilaqu¹, Farah H. Ningrum², Zulfikar Naftali ³

¹Departemen Radiologi, FK Universitas Diponegoro, Semarang

²Departemen Radiologi, FK Universitas Diponegoro-RSUP Dr. Kariadi Semarang

³Departemen THT-KL, FK Universitas Diponegoro--RSUP Dr. Kariadi, Semarang

e-mail korespondensi: drnilaqu@gmail.com

Abstrak

15

Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan khususnya di negara berkembang, kasus OMSK disertai *acquired cholesteatoma* sering menyebabkan komplikasi berbahaya dan memiliki tingkat morbiditas serta mortalitas tinggi. Pemeriksaan CT scan mastoid irisan tipis 0,625mm dapat mendeteksi adanya *cholesteatoma*, erosi dan destruksi tulang secara rinci. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan *cross sectional*. Subjek penelitian 30 pasien OMSK berusia 18-60 tahun yang dilakukan *CT scan* Mastoid irisan tipis 0,625mm di RSUP Dr. Kariadi, Semarang dan terdapat adanya *cholesteatoma* serta destruksi tulang. Subjek penelitian diperoleh pada bulan Mei hingga Desember 2015. Hasil penelitian menunjukkan pneumatiasi mastoid tipe 1 (hipopneumatasi) dan derajat destruksi tulang ringan didapatkan pada sebagian besar subjek yaitu 20 dan 21, namun tidak terdapat korelasi antara tipe pneumatiasi mastoid dengan derajat destruksi tulang ($p > 0,367$ atau $p > 0,05$). Pada penelitian ini memberikan kesimpulan semakin rendah tipe pneumatiasi mastoid, maka ada kecenderungan semakin berat derajat destruksi yang terjadi.

Kata Kunci: OMSK, Pneumatiasi mastoid, *CT Mastoid*.

Abstract

7

Chronic Suppurative Otitis Media (CSOM) is still a public health problem especially in developing countries. CSOM with acquired cholesteatoma accompanied referred to as the type of hazard, as they often lead to dangerous complications and have a high rate of morbidity and mortality. Mastoid CT with 0,625mm slice thickness may reveal detail cholesteatoma and bone destruction. It's an analytic observational study with cross sectional design. This study consisted of 30 cases CSOM, aged 18-60 years and had a 0,625mm slice thickness CT scan mastoid examinations in Dr. Kariadi Hospital Semarang and indicating a cholesteatoma and bone destructions. The result showed that hypopneumatization type and mild degree of bone destructions obtained in most subjects, each 20 and 21, but there's no correlation between mastoid pneumatization and bone destruction ($p > 0,367$ or $p > 0,05$). This study showed more lower type of the mastoid pneumatization, more severe degree of bone destructions.

Keywords: CSOM, mastoid pneumatization, Mastoid CT

Pendahuluan

Otitis media supuratif kronis (OMSK) adalah radang kronis telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan riwayat keluarnya sekret dari telinga (otorea) lebih dari 3 bulan, baik terus menerus maupun hilang tumbul (Santosh et al., 2011). OMSK merupakan penyebab masalah kesehatan yang signifikan di berbagai belahan dunia. Penyakit ini banyak terdapat pada negara berkembang dengan kondisi kumuh, padat dan tingkat *hygiene* rendah (WHO, 2004). Prevalensi OMSK pada negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sosioekonomi yang rendah, lingkungan kumuh, status kesehatan dan gizi jelek. Pada tahun 2013, prevalensi OMSK di Indonesia adalah 3,8% dan pasien OMSK merupakan 21% pasien yang berobat di poliklinik THT Rumah Sakit di Indonesia (Djaafar, 2009; Hidayat, 2013). OMSK disertai *cholesteatoma* sering disebut sebagai tipe bahaya, karena sering menyebabkan komplikasi-komplikasi berbahaya dan memiliki tingkat morbiditas serta mortalitas tinggi (Sadoghi et al., 2007).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada 82 sampel, pasien *Cholesteatoma* lebih banyak ditemukan pada perempuan (53,8%) dibandingkan laki-laki (46,2%), dengan rata-rata usia sampel penelitian 30,2 tahun. Pada sisi telinga yang terkena didapatkan 42,3% kelainan ditemukan pada telinga kanan, 32,5% pada telinga kiri dan 20% ditemukan pada kedua telinga (Analise A, 2011).

Klasifikasi pneumatisasi mastoid berdasarkan CT scan dibagi menjadi 4 tipe berdasarkan derajat pneumatisasinya dalam hubungannya dengan sinus sigmoid sebagai berikut (Han SJ et al., 2007) :

1. Hipopneumatisasi adalah pneumatisasi yang berada di anteromedial terhadap garis yang terletak di aspek paling anterior dari sinus sigmoid.
2. Pneumatisasi sedang adalah pneumatisasi yang meluas ke daerah antara dua garis yang terletak di aspek paling anterior dan paling lateral dari sinus sigmoid.
3. Pneumatisasi baik adalah pneumatisasi yang meluas ke daerah antara dua garis yang terletak di aspek paling lateral dan paling posterior dari sinus sigmoid.

4. Hiperpneumatisasi adalah pneumatisasi yang meluas ke posterolateral sesudah garis yang terletak di aspek paling posterior dari sinus sigmoid.

Derajat destruksi tulang pada kasus OMSK disertai *cholesteatoma* berdasarkan CT scan dibagi menjadi 3, yaitu (Kuczkowski et al., 2011):

- a. Derajat ringan, terdapat erosi pada skutum (dinding lateral dari epitimpani) dan sebagian osikel.
- b. Derajat sedang, terdapat destruksi pada tegmen timpani dan seluruh osikel.
- c. Derajat berat, terdapat destruksi pada seluruh osikel, labirin, kanalis fasialis dan liang telinga luar.

Pemeriksaan *Multi Slice Computed Tomography*, resolusi tinggi (HRCT) irisan tipis 0,625mm dapat menilai pneumatisasi mastoid dan struktur osikel lebih rinci dan CT scan preoperatif memiliki angka sensitivitas hampir 100% serta spesifitas 89%, sehingga dijadikan pemeriksaan standar emas sebelum dilakukan tindakan pembedahan (Sade J, 1997; Analise A, 2011).

4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan rancangan *cross sectional*, menggunakan data sekunder hasil pemeriksaan CT scan Mastoid di RSUP Dr. Kariadi Semarang selama 8 bulan mulai dari Mei hingga Desember 2015.

Subjek penelitian adalah 30 pasien yang telah didiagnosis OMSK, memenuhi kriteria inklusi sebagai subjek penelitian (berusia 18 - 60 tahun, dilakukan pemeriksaan CT scan Mastoid di RSUP dr. Kariadi Semarang, hasil CT scan menunjukkan adanya *cholesteatoma* serta destruksi tulang) dan kriteria eksklusi (terdapat kelainan kongenital regio mastoid dan temporal, riwayat trauma, tumor atau menjalani operasi regio mastoid dan temporal). Penelitian ini menggunakan *MSCT scan 16 slice Optima CT520 General Electrics* resolusi tinggi (HRCT) tanpa kontras dilakukan dengan irisan tipis 0,625 mm, filter Kernel H 70 very sharp dan algoritma tulang (*bone window*) *window width* sebesar 4.000 HU dan *window level*

sebesar 600 HU, 129Kv, 180 mAs, posisi *supine* melalui seluruh tulang temporal yang kemudian dilakukan rekonstruksi aksial dan koronal. Data pasien OMSK kemudian dikumpulkan melalui pengisian kuesioner/wawancara atau telusur rekam medis. Selanjutnya dilakukan evaluasi CT *scan* Mastoid dan hasil CT *scan* menunjukkan adanya *cholesteatoma* serta destruksi tulang.

Data diambil setelah mendapatkan persetujuan subyek penelitian atau setelah mengisi *informed consent* dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk tabel frekuensi, grafik dan rerata ± SD serta dianalisis secara *non-parametric* menggunakan uji korelasi *Rank Spearman's*.

Penelitian ini telah mendapatkan ijin dari tim *ethical clearance* FK UNDIP/RSUP dr. Kariadi Semarang dengan nomor : 606/EC/FK-RSDK/2015 dan telah mendapatkan ijin melaksanakan penelitian di RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan nomor : DL.00.02/I.II/3666/2015.

Hasil Penelitian

¹⁰
Subyek penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 19 dengan usia termuda subyek adalah 18 tahun sedangkan usia tertua 57 tahun. Subyek terbanyak terdapat pada kelompok usia 21-30 tahun dan lebih dari 40 tahun, yaitu masing-masing 10 orang (33,3%). (Tabel 1)

Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian (n=30)

	Variabel	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	11	36,7
	Perempuan	19	63,3
Usia (tahun)	≤ 20	2	6,7
	21-30	10	33,3
	31-40	8	26,7
	> 40	10	33,3

Tipe pneumatisasi mastoid dan derajat destruksi tulang pada CT *scan* mastoid tanpa kontras dibaca oleh dua Radiolog dan dengan menggunakan uji Kappa didapatkan hasil yang

tidak berbeda, yang berarti hasil penilaian kedua radiolog adalah setara.

Karakteristik tipe pneumatisasi mastoid dan destruksi tulang ditampilkan pada tabel 2, sedangkan sisi kepala yang terkena ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 2. Karakteristik Tipe Pneumatisasi Mastoid dan Derajat Destruksi Tulang

Karakteristik	Jumlah	%
Tipe Pneumatisasi mastoid		
1. Hipopneumatisasi	20	66,7
2. Pneumatisasi sedang	5	16,7
3. Pneumatisasi baik	3	10,0
4. Hiperpneumatisasi	2	6,7
Derajat destruksi tulang		
1. Ringan	21	70,0
2. Sedang	8	26,7
3. Berat	1	3,3


Tabel 3. Karakteristik Telinga yang Terlibat Menurut Sisi Kepala

Sisi kepala	Telinga yang terlibat	Jumlah	%
Kanan		18	60
Kiri		12	40
Total		30	100


Percentase tipe pneumatisasi mastoid dan derajat destruksi tulang secara CT Scan pada penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada gambar 1 A dan 1 B.

Berdasarkan uji *Shapiro Wilk*, data tipe pneumatisasi mastoid dan derajat destruksi tulang tidak berdistribusi normal ($p < 0,05$), sehingga dilakukan uji korelasi nonparametrik menggunakan uji korelasi *Rank Spearman's*.

Pada gambar 2 diagram sebaran (*scattered plot*) tampak pola yang menunjukkan semakin rendah tipe pneumatisasi mastoid, maka ada kecenderungan semakin berat derajat destruksi yang terjadi, namun setelah diuji statistik



Gambar 1. Diagram Persentase Tipe Pneumatisasi Mastoid Dan Derajat Destruksi Tulang



Gambar 2. Scattered Plot Korelasi Tipe Pneumatisasi Dengan Derajat Destruksi Tulang

Tabel 4. Koefisien Korelasi Pneumatisasi Mastoid dengan Derajat Destruksi Tulang

Variabel	Derajat destruksi tulang		
	N	rho	p
Pneumatisasi mastoid	30	0,171	0,367

dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman's* menunjukkan korelasi tidak bermakna antara tipe pneumatisasi mastoid dengan derajat destruksi tulang dikarenakan nilai signifikansi (*p*) 0,367 atau *p* > 0,05.

Pembahasan

Mayoritas subyek pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu 19 orang, sedangkan sisi telinga yang terkena paling banyak didapatkan pada telinga kanan, yaitu 18 orang (60%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada 82 subyek, dimana pasien *cholesteatoma* lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki, dengan sisi telinga yang terkena didapatkan 42,3% pada telinga kanan, 32,5% pada telinga kiri dan 20% ditemukan pada kedua telinga (Analise A, 2011).

Pada penelitian ini tipe pneumatisasi mastoid yang terbanyak didapatkan pada tipe 1 (hipopneumatisasi) yaitu 20 subyek dari 30 subyek, yang diikuti dengan tipe 2 (pneumatisasi sedang) 5 subyek, tipe 3 (pneumatisasi baik) 3 subyek dan tipe 4 (hiperpneumatisasi) hanya terdapat pada 2 subyek. Derajat destruksi tulang yang didapatkan pada penelitian ini sebagian besar adalah derajat 1 (ringan) yaitu sebanyak 21 subyek, sedangkan derajat 2 (sedang) dan 3 (berat) masing-masing hanya sebanyak 8 dan 1 subyek.

Penelitian ini menunjukkan semakin rendah tipe pneumatisasi, maka akan semakin berat destruksi tulang yang terjadi. Hal ini sesuai dengan keputusan yang menyatakan bahwa OMSK yang disertai *cholesteatoma* lebih banyak terjadi pada tipe hipopneumatisasi dan sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Kucur et al (2013), dimana destruksi tulang didapatkan lebih banyak pada pasien OMSK dengan *cholesteatoma* dan pneumatisasi mastoid yang kurang, hal ini disebabkan bahwa pneumatisasi mastoid yang kurang dan oklusi tuba *eustachius* yang terjadi pada pasien OMSK dapat mempercepat destruksi tulang (Kucur et al., 2013).

Tidak adanya hubungan antara tipe pneumatisasi mastoid dengan derajat destruksi tulang pada OMSK disertai *acquired cholesteatoma* secara *CT scan* pada penelitian ini, dapat disebabkan antara lain oleh karena tipe pneumatisasi mastoid dan derajat destruksi tulang tidak berdistribusi normal (*p*<0,05), dan keterbatasan pada penelitian ini tidak menyamakan durasi sakit ataupun pekerjaan subyek.

Kesimpulan

Tidak terdapat korelasi antara tipe pneumatiasi mastoid dengan derajat destruksi tulang pasien OMSK disertai *acquired cholesteatoma* secara *CT scan*.

Daftar Pustaka

- Analise A, Marcos I. 2011. *Comparative Study Between Radiological and Surgical Findings of Chronic Otitis Media*. Brazil. Intl. Arch. Otorhinolaryngol. 15: 72-78
- Djaafar ZA. 2009. Kelainan Telinga Tengah. Di dalam: Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; p.64-85.
- Han SJ, et al. 2007. *Classification of Temporal Bone Pneumatization Based On Sigmoid Sinus Using Computed Tomography*. Korea Clinical Radiology. 62: 1110-8.
- Hidayat I. 2013. Faktor-Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Multidrug Resistant Organism pada OMSK di RSUP Dr. Kariadi [tesis]. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kuczkowski P, et al. 2011. *Usefulness of Computed Tomography Hounsfield Unit Density In Preoperative Detection Of Cholesteatoma In Mastoid Ad Antrum*. Am J Otolaryngol. 32(3): 194-7
- Sade J, Fuchs C. 1997. *Secretory Otitis Media in Adults: II. The Role of Mastoid Pneumatization as a Prognostic Factor*. Ann Otol Rhinol Laryngol. 116: 37-40.
- Sadoghi M, et al. 2007. *The Validity of Computed Tomography in Complicated Chronic Otitis Media*. J Radiol. 4(3): 175-9.
- Santosh UP, et al. 2011. *A Study of The Correlation of The Clinical Features, Radiological Evaluation and Operative Finding In Chronic Suppurative Otitis Media With Cholesteatoma*. Gujarat Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery. 8(1): 17-9
- WHO. 2004. *Chronic Suppurative Otitis Media: Burden of Illness and Management Options*. Child and adolescent health and development prevention of blindness and deafness. Switzerland. 7-8

Korelasi Pneumatisasi Mastoid dengan Derajat Destruksi Tulang Pada OMSK Disertai Acquired Cholesteatoma Secara CT-Scan

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | jurnal.unej.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 2 | Chaflin T. Lamba, Herdy Munayang, Lisbeth F. J. Kandou. "Gambaran Tingkat Kecemasan pada Warga yang Tinggal di Daerah Rawan Banjir Khususnya Warga di Kelurahan Tikala Ares Kota Manado", e-CliniC, 2017
Publication | 1 % |
| 3 | Rasmijon Rasmijon, Muhammad Yamin, Syahrial M. Hutaarak, Cleopas Martin Rumende. "Korelasi Keparahan Penyakit Jantung Koroner dengan Dispersi QT pada Pasien Obstructive Sleep Apnea (OSA)", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2019
Publication | <1 % |
| 4 | dspace.hangtuah.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 5 | jurnal.uns.ac.id
Internet Source | <1 % |

- | | | |
|----|--|------|
| 6 | ojs.stiami.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 7 | www.neliti.com
Internet Source | <1 % |
| 8 | www.thejhpb.com
Internet Source | <1 % |
| 9 | ceccm.org
Internet Source | <1 % |
| 10 | eprints.mercubuana-yogya.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 11 | oro.open.ac.uk
Internet Source | <1 % |
| 12 | Sabeeh Beig, S. C. Sharma, Mohd Khalid.
"Revisiting Correlation Between Pre Operative High Resolution Computed Tomography and Operative Findings in Attico Antral Disease", Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 2018
Publication | <1 % |
| 13 | darryltanod.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 14 | docplayer.com.br
Internet Source | <1 % |
| 15 | repository.stikes-bhm.ac.id
Internet Source | <1 % |

16

"Temporal bone pneumatization and septal deviation in cleft lip and palate patients", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, 2014

Publication

<1 %

17

Yashveer J. K, Devendra Pankaj, Tripti Sonker.
"CORRELATION OF RADIOLOGICAL AND OPERATIVE FINDING REGARDING THE CELLULARITY OF MASTOID IN CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA (ATTICOANTRAL DISEASE)", Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences, 2018

Publication

<1 %

18

academicjournals.org

Internet Source

<1 %

19

r2kn.litbang.kemkes.go.id

Internet Source

<1 %

20

www.amedeo.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On

Korelasi Pneumatisasi Mastoid dengan Derajat Destruksi Tulang Pada OMSK Disertai Acquired Cholesteatoma Secara CT-Scan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5
