

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Korelasi Diameter Selubung Nervus Optik dan Marshall CT Score dengan Skala Koma Glasgow pada Cedera Kepala

Jumlah Penulis : 2 orang

Status Pengusul : Hermina Sukmaningtyas (sebagai penulis ke-2)

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : Neurona (Majalah Kedokteran Neurosains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia)

b. Nomor ISSN : 0216-6402

c. Volume nomor bulan tahun : Volume 35, Nomor 3, Tahun 2018

d. Penerbit : Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Indonesia Neurological Association)

e. DOI artikel (Jika ada) : --

f. Alamat web Jurnal : <http://www.neurona.web.id/paper-detail.do?id=1057>

g. Terindeks di : Sinta 2

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri Ppada kategori yang tepat) :

☐ Jurnal Ilmiah Internasional / internasional bereputasi \*

☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

☐ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

| NO                   | KOMPONEN YG DINILAI                                            | Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah               |                           |                          | Nilai Akhir Yang Diperoleh |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                | Internasional/<br>internasional bereputasi | Nasional<br>Terakreditasi | Nasional ***             |                            |
|                      |                                                                | <input type="checkbox"/>                   | 25                        | <input type="checkbox"/> |                            |
| a                    | Kelengkapan unsur isi buku (10%)                               |                                            | 2.5 x 40% / 1 = 1         |                          | 1,0                        |
| b                    | Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)                   |                                            | 7.5 x 40% / 1 = 3         |                          | 2,5                        |
| c                    | Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%) |                                            | 7.5 x 40% / 1 = 3         |                          | 2,5                        |
| d                    | Kelengkapan unsur dan berkualitas terbitan/ jurnal (30%)       |                                            | 7.5 x 40% / 1 = 3         |                          | 2,7                        |
| Nilai Total = (100%) |                                                                |                                            | 25 x 40% / 1 = 10         |                          | 8,7                        |
| Nilai Pengusul = 10  |                                                                |                                            |                           |                          |                            |

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer

intinya isinya lengkap - abstrak, Pembahasan yang cukup  
 - kedalaman pembahasan : cukup dan metodologi cukup  
 - kecukupan, kemutakhiran data dan metodologi cukup  
 studi kualitatif observasional retrospektif yg didukung  
 prestasi baru dan relevan, hanya 11,52 > 60%

Semarang, .....  
 Reviewer I

3 Maret 20

*(Signature)*

Prof. Dr. drg. OEDIJANI, M.S.  
 NIP 194902091979012001

Unit kerja : Fakultas Kedokteran  
 Bidang Ilmu : Ilmu Kedokteran Gigi  
 Jabatan/Pangkat : Guru Besar

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW***  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Korelasi Diameter Selubung Nervus Optik dan Marshall CT Score dengan Skala Koma Glasgow pada Cedera Kepala

Penulis Artikel Ilmiah : 2

Status Pengusul : Penulis pertama/**penulis anggota**/penulis korespondensi

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : Neurona (Majalah Kedokteran Neurosains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf

b. Nomor/Volume/H: Volume 35, Nomor 3, Tahun 2018

c. Edisi (bulan/tahun : Juni/2018

d. Penerbit : Perhimpunan Dokter Spesialis oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Indonesia Neurological Association)

e. Jumlah halaman : 6

f. DOI artikel (Jika : -

g. Alamat web Jurnal : <http://www.neurona.web.id/paper->

h. Terindeks di : Sinta 2

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional  
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
☐ Jurnal Ilmiah Nasional tidak Terakreditasi


I. Hasil Penilaian *Peer Review* :

| Komponen Yang Dinilai                   | Nilai Maksimal Karya Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai) |                        |                              | Nilai Akhir Yang Diperoleh |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                         | Internasional                                             | Nasional Terakreditasi | Nasional tidak Terakreditasi |                            |
|                                         |                                                           | 25                     |                              |                            |
| a. Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi |                                                           | 2,5                    |                              | 2,00                       |
| b. Ruang lingkup dan kedalaman          |                                                           | 7,5                    |                              | 7,00                       |
| c. Kecukupan dan kemutakhiran           |                                                           | 7,5                    |                              | 5,50                       |
| d. Kelengkapan unsur dan kualitas       |                                                           | 7,5                    |                              | 7,00                       |
| Nilai Total = (100%)                    |                                                           | <b>25</b>              |                              | <b>21,50</b>               |
| Nilai pengusul = <b>40% X 21,50</b>     |                                                           |                        |                              | <b>8,60</b>                |

**KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW**

|                                            |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur           | : Abstrak disajikan dengan baik dan informatif, Pendahuluan-metode penelitian dan hasil penelitian, diskusi dan referensi sudah sesuai kaidah ilmiah yg baik    |
| Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan     | : Ruang lingkup keilmuan sudah sesuai bidang ilmu pengusul dan pembahasan cukup dalam dengan membandingkan hasil dg penelitian2 sebelumnya                      |
| Kecukupan & Kemutakhiran Data & Metodologi | : Data retrospektif dikumpulkan dengan menggunakan CM sehingga tidak bisa mengontrol bias pengukuran yang mungkin bisa terjadi. Metode penelitian belah lintang |
| Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit    | : Termasuk penerbit yang berkualitas tingkat nasional, dan sudah terakreditasi SINTA 2                                                                          |

Semarang,  
 Penilai 2



Prof. Dr. dr. TRI XUR KRISTINA, DMM, M.Kes.  
 NIP 19590527 198603 2 001

Unit kerja : Fakultas Kedokteran  
 Bidang Ilmu : Ilmu Kedokteran  
 Jabatan/Pangkat : Guru Besar

Kata Kunci..

- Neurona merupakan satu-satunya jurnal yang memuat perkembangan penelitian dan kasus terbaru bidang neurosains di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan setiap 3 bulan sekali oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf di Indonesia.

- Sekretariat:  
Departemen Neurologi FKUI/  
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430, Indonesia

Telp. +62 21 31903219 Fax. +62 21 2305856

Phone: 081380651980

Email: [neurona.perdossi@gmail.com](mailto:neurona.perdossi@gmail.com)

- Pilih Edisi

Vol. 35 No. 3 Juni 2018

*PETUNJUK PENULIS*

*PENGAJUAN ARTIKEL*

*SURAT KOMITMEN*

*SURAT TIDAK PLAGIAT*

Silahkan unduh kelengkapan pengiriman artikel tersebut dan kirimkan kembali ke email redaksi setelah diisi.

- [Home](#)
- / Vol. 35 No. 3 Juni 2018

## Vol. 35 No. 3 Juni 2018

### [PENGARUH AKTIVITAS PENGASUHAN CUCU TERHADAP FUNGSI KOGNITIF PADA PEREMPUAN LANSIA](#)

Frederica Jovianti,\* Linda Suryakusuma,\* Yuda Turana,\* Yvonne Suzy Handajani\*

**Introduction:** Cognitive impairment is a neurodegenerative process which often experienced by the elderly. One of the factors associated with cognitive function is grandparenting which is common and has become a social norm in Indonesia.

### [PERAN VISUAL EVOKED POTENTIAL PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE-2 DENGAN DAN TANPA RETINOPATI DIABETIK](#)

Bill Jones Tanawal,\* Melke Joanne Tumboimbela,\*\* Corry Novita Mahama\*\*

**Introduction:** Diabetic retinopathy (DR) is a common complication of type-2 diabetes mellitus (T2DM). Minimal functional change of neural layers of the retina occurs before structural changes, thus undetected by

# NEURONA



MAJALAH KEDOKTERAN NEUROSAINS PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS SARAF INDONESIA

**Pengaruh Aktivitas Pengasuhan Cucu terhadap Fungsi Kognitif pada Perempuan Lansia**

***Peran Visual Evoked Potential* pada Pasien Diabetes Melitus Tipe-2 dengan dan Tanpa Retinopati Diabetik**

**Penilaian Kualitas Hidup EORTC QLQ-C30 dan EORTC QLQ-BN20 pada Pasien Tumor Primer Intrakranial Pascaterapi**

**Faktor-faktor yang Memengaruhi Neuropati Perifer Terkait HIV di Manado**

**Korelasi Diameter Selubung Nervus Optik dan Marshall CT Score dengan Skala Koma Glasgow pada Cedera Kepala**

**Prediktor *Symptomatic Intracerebral Hemorrhage* Pascatrektomisasi Intravena pada Stroke Iskemik Akut**

**Palidotomi untuk Penyakit Parkinson: Laporan 3 Kasus**

**Profil Pasien Sindrom Terowongan Karpal di Poliklinik Saraf RSUP Sanglah Denpasar**

**Pengukuran Tingkah Laku pada Model Nyeri Neuropatik Perifer: Tikus dengan CCI (*Chronic Constriction Injury*)**

**Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Luaran Klinis Pasien Tetanus di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang**

**Diseksi Arteri Karotis Internal Postpartum**

Volume 35 Nomor 3 Juni 2018

Vol. 35 No. 3 Juni 2018

**Terakreditasi DIKTI Nomor: 12/M/Kp/II/15**

funduscopy. This damage could be identified earlier by P100 latency changes in visual evoked potential (VEP).

## [PENILAIAN KUALITAS HIDUP EORTC QLQ-C30 DAN EORTC QLQ-BN20 PADA PASIEN TUMOR PRIMER INTRAKRANIAL PASCATERAPI](#)

Ratih Puspita,\* Yusuf Wibisono,\* Henny Anggraini Sadeli\*

**Introduction:** Increasing number of surviving primary intracranial tumor patients in line with discovery of new treatment will increase the patient's morbidity. This makes quality of life of patient need to be evaluated.

## [FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NEUROPATI PERIFER TERKAIT HIV DI MANADO](#)

Deivy Cirayow,\* Arthur Hendrik Philips Mawuntu,\* Herlyani Khosama\*

**Introduction:** There are several sociodemographic and clinical factors that influence the development of HIV associated peripheral neuropathy (HIV-PN). Manado has different sociodemographic and clinical characteristics from other regions. However, the percentage of HIV-PN and its influencing factors are unknown.

## [KORELASI DIAMETER SELUBUNG NERVUS OPTIK DAN MARSHALL CT SCORE DENGAN SKALA KOMA GLASGOW PADA CEDERA KEPALA](#)

Rani Maria Yogipranata,\* Hermina Sukmaningtyas\*

**Introduction:** In traumatic brain injury (TBI), non-contrast brain CT scan is able to detect an increase in intracranial pressure, which is crucial in patient's management. Optic nerve sheath diameter's (ONSD) measurement is a new method that is expected to assess an increase in intracranial pressure noninvasively. Marshall CT score is a valid instrument, a de facto standard to classify head injury patient which correlates with an increased intracranial pressure.

## [PREDIKTOR SYMPTOMATIC INTRACEREBRAL HEMORRHAGE PASCATROMBOLISIS INTRAVENA PADA STROKE ISKEMIK AKUT](#)

Al Rasyid,\* Salim Harris,\* Mohammad Kurniawan,\* Rakhmad Hidayat,\* Taufik Mesiano\*

**ABSTRACT** Despite its effectiveness, the percentage of ischemic stroke patients who received definitive treatment, thrombolysis, never went above 10%, due to one of the reason is the occurrence of severe, post-therapeutic complications, such as symptomatic intracerebral hemorrhage (sICH). Several factors contribute to sICH occurrence are age, severity of stroke, early changes of ischemic sign, hyperglycemia, blood pressure, antiplatelet use and its interval.

## [PALIDOTOMI UNTUK PENYAKIT PARKINSON: LAPORAN 3 KASUS](#)

Muhammad Agus Aulia,\* Adolf Setiabudi,\* Handrianto Setiajaya,\* Agus Yunianto,\* Lukman Ma ruf\*

**ABSTRACT** Pallidotomy for Parkinson's disease has recently developed in Indonesia for the last 6 years. Unlike Deep Brain Stimulation (DBS) implantation, Pallidotomy procedure is fully covered by Indonesian National Health Insurance, therefore it is expected that this procedure could be perform to all indicated Parkinson's Disease (PD) patients.

## [PROFIL PASIEN SINDROM TEROWONGAN KARPAL DI POLIKLINIK SARAF RSUP SANGLAH DENPASAR](#)

I Komang Arimbawa,\* Ni Komang Dewi Mahayani,\* I Gusti Ngurah Purna Putra, Thomas Eko Purwata\*

**Introduction:** Carpal tunnel syndrome (CTS) is the entrapment of the median nerve at the carpal tunnel.

## [PENGUKURAN TINGKAH LAKU PADA MODEL NYERI NEUROPATIK PERIFER: TIKUS DENGAN CCI \(CHRONIC CONSTRICTION INJURY\)](#)

Hanik Badriyah Hidayati,\* Paulus Sugianto,\* Junaidi Khotib,\*\* Chrismawan Ardianto,\*\* Kuntoro,\*\* Mohammad Hasan Machfoed\*

## Pengurus

Tiara Aninditha  
Maula Gaharu  
Fitri Octaviana  
Mumfaridah  
Yuda Turana  
Herlyani Khosama  
Paulus Sugianto  
Shahdevi Nandar Kurniawan  
Winnugroho Wiratman

Pemimpin Umum  
Pemimpin Usaha  
Pemimpin Redaksi  
Sekretaris Redaksi  
Redaksi Pelaksana  
Redaksi Pelaksana  
Redaksi Pelaksana  
Redaksi Pelaksana  
Redaksi Pelaksana

# Tambah Wawasan dengan Neurona

## Publikasikan penelitian Anda!

### Kirimkan segera ke:

***neurona.perdossi@gmail.com***

### Informasi lebih lanjut:

***http://www.neurona.web.id/***



Terindeks di



# KORELASI DIAMETER SELUBUNG NERVUS OPTIK DAN MARSHALL CT SCORE DENGAN SKALA KOMA GLASGOW PADA CEDERA KEPALA

*by* Hermina Sukmaningtyas

---

**Submission date:** 13-Jul-2020 01:55PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1356888904

**File name:** 9\_Turnitin.pdf (340.55K)

**Word count:** 3192

**Character count:** 18494

## KORELASI DIAMETER SELUBUNG NERVUS OPTIK DAN MARSHALL CT SCORE DENGAN SKALA KOMA GLASGOW PADA CEDERA KEPALA

### CORRELATION BETWEEN OPTIC NERVE SHEATH DIAMETER AND MARSHALL CT SCORE WITH GLASGOW COMA SCALE IN TRAUMATIC BRAIN INJURY

Rani Maria Yogipranata,\* Hermina Sukmaningtyas\*

#### ABSTRACT

**Introduction:** In traumatic brain injury (TBI), non-contrast brain CT scan is able to detect an increase in intracranial pressure, which is crucial in patient's management. Optic nerve sheath diameter's (ONSD) measurement is a new method that is expected to assess an increase in intracranial pressure noninvasively. Marshall CT score is a valid instrument, a de facto standard to classify head injury patient which correlates with an increased intracranial pressure.

**Aims:** To see the correlation between ONSD and Marshall CT score with Glasgow Coma Scale (GCS).

**Methods:** This was a retrospective, analytic observational with cross-sectional research's design taken from the patients' medical record admitted in Dr. Kariadi Hospital, Semarang, between March-August 2017. Measurement of ONSD and Marshall CT score were done by a radiologist. Rank Spearman's were used to assess the correlation between variables.

**Results:** There were 34 subjects, the majority were man (67,6%), with highest incidents in less than 30 years age (41,2%) and mostly caused by accident (76,4%). Statistical analysis showed a moderate negative degree correlation between ONSD and Marshall CT score with GCS.

**Discussion:** Enlargement of ONSD and higher Marshall CT score were correlated negatively related with the GCS in TBI patients with increased intracranial pressure.

**Keywords:** Glasgow Coma Scale, Marshall CT score, optic nerve sheath diameter's, traumatic brain injury

#### ABSTRAK

**Pendahuluan:** Pada cedera kepala atau *traumatic brain injury* (TBI), penggunaan CT scan kepala tanpa kontras dapat mendeteksi tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (TIK), yang penting bagi tata laksana pasien. Sementara pengukuran diameter *optic nerve sheath* yang disebut *optic nerve sheath diameter* (ONSD) merupakan metode baru yang diharapkan dapat menilai peningkatan tekanan intrakranial secara non-invasif. Marshall CT score merupakan instrumen valid dan menjadi standar *de facto* dalam mengklasifikasikan pasien cedera kepala yang berkorelasi dengan peningkatan TIK.

**Tujuan:** Untuk melihat adanya korelasi antara diameter N. Optikus dan Marshall CT score dengan Skala Koma Glasgow (*Glasgow Coma Scale*/GCS).

**Metode:** Penelitian analitik observasional retrospektif secara potong lintang dari data rekam medis pasien cedera kepala dewasa yang dirawat di RSUP Prof. Dr. Kariadi, Semarang, pada bulan Maret-Agustus 2017. Selanjutnya kesemua subjek dilakukan pengukuran ONSD pada kedua mata serta penilaian Marshall CT score oleh seorang spesialis radiologi. Dilakukan uji korelasi Rank Spearman's untuk menilai ketiga parameter tersebut.

**Hasil:** Terdapat 34 subjek yang terutama laki-laki (67,6%) dengan usia terbanyak <30 tahun (41,2%) dan penyebab terbanyak adalah kecelakaan (76,4%). Didapatkan korelasi negatif derajat sedang antara ONSD dan Marshall CT score dengan GCS.

**Diskusi:** Peningkatan diameter *optic nerve sheath* dan Marshall CT score berkorelasi dengan penurunan skor GCS pada pasien cedera kepala yang mengalami peningkatan TIK.

**Kata kunci:** Cedera kepala, diameter *optic nerve sheath*, Marshall CT score, Skala Koma Glasgow

\*Departemen Radiologi FK Universitas Diponegoro/RSUP Dr. Kariadi, Semarang. **Korespondensi:** raniyogipranata@gmail.com.

#### PENDAHULUAN

Cedera kepala atau *traumatic brain injury* (TBI) merupakan masalah kesehatan dan sosioekonomi yang utama.<sup>1-2</sup> Dengan insiden yang tinggi, cedera kepala merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas pada kelompok usia muda <45 tahun.<sup>3</sup> Hal ini terutama ditemukan pada populasi Asia (344/100.000 penduduk) dibandingkan Eropa

(235/100.000 penduduk) maupun Amerika Serikat (103/100.000).<sup>4-5</sup> Sebanyak 40% penderita yang berhasil selamat dari cedera kepala memiliki sekuele jangka panjang serta disabilitas yang akan menjadi beban ekonomi serta menghambat kualitas hidup.<sup>2,6-7</sup>

Tata laksana yang tepat secara bermakna mengurangi morbiditas dan mortalitas, mengurangi kunjungan rumah sakit dan biaya kesehatan.<sup>2,7</sup>


Pemeriksaan CT scan kepala tanpa kontras berperan penting dalam tata laksana cedera kepala akut untuk menentukan ada dan luasnya cedera, serta perencanaan bedah dan intervensi invasif lainnya.<sup>8</sup> CT scan menjadi pilihan modalitas utama berdasarkan *appropriateness criteria* (ACR) karena pemeriksaannya yang cepat, banyak tersedia, dan sensitif dalam menunjukkan cedera struktural, serta penting dalam membantu menentukan prognosis luaran pasien.<sup>9-10</sup>

Pada cedera kepala terjadi dua tahapan mekanisme cedera, yaitu cedera primer (*primary insults*) yang terjadi pada saat kecelakaan dan cedera sekunder (*secondary insults*) yang merupakan kerusakan non-mekanik dan kelanjutan proses patologis saat terjadi cedera. Cedera sekunder menyebabkan edema vasogenik dan sitotoksik serta mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial (TIK). Proses cedera sekunder terus berjalan, sehingga tindakan intervensi dini terhadap proses ini dapat memperbaiki prognosis pasien.<sup>3,9</sup>

Secara klinis, tanda-tanda peningkatan TIK dapat dinilai menggunakan Skala Koma Glasgow (SKG) atau *Glasgow Coma Scale* (GCS). Pada kondisi peningkatan TIK atau beratnya kelainan yang diderita, maka skor SKG akan semakin rendah dan kondisi pasien semakin buruk.<sup>3,9</sup> Penelitian Novkoski M dkk, membuktikan adanya korelasi antara peningkatan TIK dengan penurunan SKG.<sup>11</sup> Oleh karena itu diperlukan pengukuran peningkatan TIK yang bersifat non-invasif, antara lain menggunakan Marshall CT score. Instrumen ini valid dan menjadi standar *de facto* dalam mengklasifikasikan pasien cedera kepala berdasarkan gambaran CT scan dan berkorelasi dengan peningkatan TIK.<sup>9,12-13</sup>

Pengukuran diameter selubung N. Optik (*optic nerve sheath diameter's/ONSD*) merupakan metode baru bagi pengukuran TIK non-invasif.<sup>7,14-18</sup> ONSD terpilih menjadi salah satu indikator peningkatan TIK karena bersifat stabil dan konstan pada TIK yang normal, serta memiliki korelasi linear dengan peningkatan TIK.<sup>19-20</sup> Kompleks selubung N. Optik memiliki ruang subaraknoid yang berhubungan langsung dengan ruang subaraknoid sisterna kiasma otak, sehingga terjadi transfer bebas cairan serebrospinal

diantara dua kompartemen tersebut. Proses tersebut menjelaskan adanya tekanan yang sama diantara dua kompartemen tersebut (Gambar 1).<sup>18</sup>



**Gambar 1. Ilustrasi Ruang Cairan Serebrospinal yang Mengelilingi Kiasma Optik**

Ruang cairan serebrospinal intrakranial (A) dan cairan serebrospinal mengelilingi nervus optikus (ruang serebrospinal orbita) (B), ruang subaraknoid paling sempit pada regio kanalikular (C), ruang subaraknoid segmen intraorbital memiliki banyak septa (D), sementara ruang subaraknoid segmen retrobulbar memiliki trabekula-trabekula kecil (E).<sup>18</sup>

Pengukuran ONSD dapat dilakukan secara ultrasonografi maupun CT scan,<sup>14</sup> namun CT scan lebih superior karena sederhana, mudah, dan objektif, serta dapat dilakukan bersamaan dengan CT scan kepala pasien cedera kepala. Adapun keterbatasan menggunakan ultrasonografi karena operator dependen.<sup>14,16,19</sup>

Diameter ONSD tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan mata kanan atau kiri.<sup>22-23</sup> Pasien dengan kavum orbita normal dan tidak memiliki kelainan endokrin menunjukkan nilai normal *optic nerve sheath complex* 3,2-5,6mm.<sup>26</sup> Geeraerts dkk dan Soldatos dkk menyarankan nilai batas (*cutoff*) untuk memprediksi peningkatan TIK adalah 5,7mm.<sup>15,18</sup>

Abdalla dkk, Legrand dkk, dan Sekhon dkk, menunjukkan adanya korelasi bermakna antara ONSD dengan menggunakan ultrasonografi maupun CT scan pada peningkatan TIK.<sup>7,14,17,19</sup> Adanya korelasi dari parameter-parameter dapat membantu tata laksana pasien cedera kepala dalam memantau TIK secara non-invasif.

## TUJUAN

Menemukan hubungan antara ONSD dan Marshall CT score dengan SKG terkait peningkatan TIK.

## METODE

Penelitian analitik observasional retrospektif secara potong lintang dari data rekam medis pasien cedera kepala dewasa yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi, Semarang pada bulan Maret-Agustus 2017. Kriteria eksklusi adalah trauma pada wajah yang mengenai orbita dan atau bola mata, memiliki kelainan pada mata yang memengaruhi nervus optikus dan kavum orbita, riwayat operasi untuk trauma kepala, riwayat stroke, tumor, atau infeksi intrakranial, serta pemeriksaan CT scan kepala tanpa kontras lebih dari 24 jam setelah trauma kepala.

Pemeriksaan CT scan menggunakan alat MSCT Siemens SOMATOM Sensation 64 Slice dengan protokol CT scan kepala tanpa kontras (kVA 120, mAs 380, dan ketebalan potongan 0,6mm). Dilakukan pengukuran diameter selubung N. Optik

dan Marshall CT score dari arsip data CT scan di bagian Radiologi RSDK oleh seorang dokter spesialis Radiologi.

Diameter selubung N. Optik kedua mata diukur menggunakan Syngo viewer pada window width 350 dan window level 40 pada potongan aksial sejajar dengan sumbu N. Optikus, dengan jarak 3mm di belakang batas posterior bola mata (Gambar 2). Selanjutnya dihitung nilai rerata ONSD kanan-kiri untuk setiap subjek. Nilai normal ONSD adalah 3,2-5,6mm dan dinyatakan abnormal jika  $\geq 5,7$ mm.

Marshall CT score mengukur status sisterna mesensefalik, derajat pergeseran garis tengah (*midline shifting*), dan perdarahan intrakranial pada CT scan kepala tanpa kontras. Volume perdarahan dihitung menggunakan volume tool application pada Syngo viewer dengan Hounsfield unit (HU) ditentukan 50-90 HU. Hasil penilaian diklasifikasikan menjadi Marshall score 1 sampai 6 (Tabel 1).<sup>14</sup>

Skor SKG diambil dari data rekam medis subjek saat di instalasi gawat darurat, diklasifikasikan

Tabel 1. Klasifikasi CT dari Marshall<sup>14</sup>

| Skor | Kategori                          | Definisi                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Diffuse Injury I                  | Tak tampak kelainan patologis intrakranial pada CT scan                                                                                                                                              |
| 2    | Diffuse Injury II                 | Sisterna masih tampak baik disertai <i>midline shifting</i> 0-5mm dan atau adanya lesi; tidak terdapat perdarahan intrakranial >25ml dengan atau tanpa disertai fraktur os kalvaria atau benda asing |
| 3    | Diffuse Injury III (pembengkakan) | Sisterna menyempit atau obliterasi dengan <i>midline shifting</i> 0-5mm; tidak terdapat perdarahan intrakranial >25ml                                                                                |
| 4    | Diffuse Injury IV (shift)         | <i>Midline shifting</i> >5mm; tidak terdapat perdarahan intrakranial >25ml                                                                                                                           |
| 5    | Evakuasi massa                    | Berbagai lesi yang dilakukan tindakan operatif                                                                                                                                                       |
| 6    | Massa tidak dievakuasi            | Perdarahan intrakranial dengan volume >25ml; tidak dilakukan tindakan operatif                                                                                                                       |



Gambar 2. Metode Pengukuran Diameter Selubung N. Optik pada CT Scan Kepala Tanpa Kontras<sup>16</sup>

menjadi cedera kepala ringan (CKR) jika SKG 14-15, cedera kepala sedang (CKS) jika SKG 9-13, dan cedera kepala berat (CKB) jika  $SKG \leq 8$ .<sup>24</sup> Analisis data menggunakan program statistik SPSS, uji korelasi non-parametrik Rank Spearman's pada  $\alpha=5\%$ .

## HASIL

Selama periode penelitian terkumpul sebanyak 110 pasien cedera kepala, namun hanya 34 orang yang dapat dijadikan subjek penelitian (Tabel 2). Mayoritas subjek adalah laki-laki (67,6%) berusia <30 tahun (41,2%) akibat kecelakaan lalu-lintas

(76,4%). Subjek juga terutama menderita cedera kepala ringan dan sedang (masing-masing 44,1%) dengan nilai ONSD yang abnormal (61,8%) dan Marshall CT *score* 5 (29,4%).

**Tabel 2. Karakteristik Subjek Penelitian (n=34)**

| Karakteristik                | n (%)     |
|------------------------------|-----------|
| <b>Usia</b>                  |           |
| • <30 thn                    | 14 (41,2) |
| • 31-50                      | 8 (23,5)  |
| • >50 tahun                  | 12 (35,3) |
| <b>Jenis kelamin</b>         |           |
| • Laki-laki                  | 23 (67,6) |
| • Perempuan                  | 11 (32,4) |
| <b>Penyebab trauma</b>       | 26 (76,5) |
| • KLL                        |           |
| • Non-KLL ( <i>assault</i> ) | 6 (17,6)  |
| • Jatuh                      | 2 (5,9)   |
| <b>SKG</b>                   |           |
| • Cedera kepala berat        | 4 (11,8)  |
| • Cedera kepala sedang       | 15 (44,1) |
| • Cedera kepala ringan       | 15 (44,1) |
| <b>ONSD</b>                  |           |
| • Normal                     | 13 (38,2) |
| • Abnormal                   | 21 (61,8) |
| <b>Marshall CT score</b>     |           |
| • Skor 1                     | 6 (17,6)  |
| • Skor2                      | 9 (26,5)  |
| • Skor3                      | 7 (20,6)  |
| • Skor4                      | 0 (0)     |
| • Skor5                      | 10 (29,4) |
| • Skor6                      | 2 (5,9)   |

KLL: kecelakaan lalu lintas; SKG: Skala Koma Glasgow; ONSD: *optic nerve sheathdiameter*.

Tabel 3 menunjukkan seluruh subjek dengan CKB (100%) memiliki ukuran diameter selubung N. Optik yang lebih besar dari normal, demikian pula pada mayoritas subjek dengan CKS (93%). Adapun subjek dengan CKR kebanyakan memiliki diameter selubung N. Optik yang normal (80%).

Uji korelasi menunjukkan adanya korelasi negatif derajat sedang antara ONSD dengan SKG ( $p=0,002$ ;  $\rho=-0,509$ ) dan antara Marshall CT *score* dengan SKG ( $p=0,003$ ;  $\rho=0,494$ ). Semakin besar diameter selubung N. Optik dan semakin tinggi Marshall CT *score*, maka nilai SKG akan semakin rendah.

**Tabel 3. Diameter Selubung Nervus Optik berdasarkan Jenis Cedera Kepala (n=34)**

| Jenis Cedera         | ONSD            |                   |
|----------------------|-----------------|-------------------|
|                      | Normal<br>n (%) | Abnormal<br>n (%) |
| Cedera kepala berat  | 0 (0)           | 4 (100)           |
| Cedera kepala sedang | 1 (7)           | 14 (93)           |
| Cedera kepala ringan | 12 (80)         | 3 (20)            |

Uji korelasi; ONSD: *optic nerve sheathdiameter*.

## PEMBAHASAN

Diameter selubung N. Optik meningkat seiring dengan beratnya cedera kepala penderita. Hasil penelitian menunjukkan pelebaran ONSD pada 100% pasien CKB, 93% pasien CKS dan hanya 20% pasien CKR. Hal ini sesuai dengan Sekhon dkk dan Legrand dkk bahwa pada kondisi terjadi peningkatan TIK, maka ONSD akan melebar.<sup>7,14,19</sup>

Pada penelitian ini didapatkan korelasi negatif derajat sedang antara ONSD dengan SKG, dan Marshall CT *score* dengan SKG, sesuai dengan Novkoski M dkk, adanya korelasi antara peningkatan TIK dengan status klinis pasien yang dinilai dalam bentuk SKG.<sup>11</sup> Sekhon MS dkk dan Legrand dkk, menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan TIK dan ONSD, serta membuktikan bahwa ONSD merupakan prediktor yang lebih baik daripada gambaran CT lainnya.<sup>7,14,19</sup> Waqas dkk tidak mendapatkan korelasi antara ONSD dengan skor SKG, namun keterbatasannya adalah tidak mendapatkan pasien cedera kepala (<4 jam) seperti pada penelitian Legrand dkk.<sup>16</sup>

Hasil penelitian ini didapatkan korelasi negatif derajat sedang antara ONSD dengan SKG karena penelitian ini mengukur ONSD pada penderita CKR, CKS, dan CKB. Adanya korelasi kuat antara peningkatan TIK dan ONSD pada penelitian Sekhon MS dkk dan Legrand dkk dapat disebabkan karena kedua penelitian tersebut hanya mengambil pasien dengan CKB saja.

Penelitian ini tidak mendapatkan subjek klasifikasi Marshall CT *score* 4 (Tabel 4), karena pasien dengan Marshall CT *score* 4 dilakukan tindakan operatif, sehingga dimasukkan ke dalam Marshall CT *score* 5. Deepika dkk menyatakan bahwa pada praktiknya keputusan untuk dilakukannya

**Tabel 4. Marshall CT Score pada Jenis Cedera Kepala**

| Jenis Cedera Kepala  | Marshall CT Score |   |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
|                      | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cedera kepala berat  | 0                 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cedera kepala sedang | 0                 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| Cedera kepala ringan | 6                 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |

operasi tidak tergantung pada jumlah perdarahan dan *midline shifting*, namun pada kondisi klinis pasien serta keputusan masing-masing ahli bedah saraf.<sup>13</sup>

Marshall CT score 5 yang didapatkan pada 3 penderita CKR (30%) (Tabel 4) semuanya disebabkan oleh non-KLL (penyerangan). Berdasarkan patofisiologi cedera kepala, efek cedera primer pada otak tergantung dari sifat trauma (mekanisme cedera, gaya, dan arah benturan). Pola kontusio tergantung gerakan kepala pada saat benturan dan pemakaian pelindung kepala.<sup>25</sup> Cedera yang terjadi pada kecepatan tinggi biasanya menghasilkan cedera lebih berat.

Percobaan menunjukkan bahwa akselerasi rotasional dapat menghasilkan cedera axonal, sementara akselerasi linear saja hanya menyebabkan kontusio dan perdarahan subdural, tanpa kehilangan kesadaran.<sup>26</sup> Mekanisme trauma tersebut dapat menjelaskan subjek dengan Marshall CT score 5 namun diklasifikasikan dalam kategori CKR, yaitu cedera akibat non-KLL (penyerangan) hanya memberikan gaya akselerasi linear dan tidak terjadi akselerasi rotasional yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran.

Keterbatasan penelitian ini karena tidak melihat penyebab cedera kepala sebagai faktor yang dapat memengaruhi ONSD, Marshall CT score, dan SKG, oleh karena ada perbedaan antara pasien dengan mekanika trauma akselerasi deselerasi yang memiliki kecepatan tinggi, dengan mekanika trauma lain (contoh: dipukul). Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini hanya menilai peningkatan tekanan intrakranial berdasarkan gambaran CT scan dengan menggunakan Marshall CT score dan tidak melakukan penilaian klinis bahwa subjek memang mengalami peningkatan tekanan intrakranial.

## KESIMPULAN

ONSD dan Marshall CT score memiliki korelasi negatif derajat sedang dengan SKG, yang

berarti pasien cedera kepala yang mengalami peningkatan TIK akan mendapat skor SKG yang semakin rendah serta ONSD dan Marshall CT score yang semakin tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Institute for Health Metrics and Evaluation. The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. Seattle: IHME; 2013.
2. Dinsmore J. Traumatic brain injury: an evidence-based review of management. Continuing Education in Anaesthesia: Critical Care & Pain. 2013;13(6):189–95.
3. Werner C, Engelhard K. Pathophysiology of traumatic brain injury. Br J Anaesth. 2007;99(1):4–9.
4. Raj R. Prognostic models in traumatic brain injury [disertasi]. Helsinki: Helsinki University Central Hospital dan University of Helsinki; 2014.
5. Peeter W, Brande R, Polinder S, Brazinova A, Steyerberg EW, Lingsma HF, dkk. Epidemiology of traumatic brain injury in europe. Acta Neurochir. 2015;157(10):1683–96.
6. Oliveira RA, Araujo S, Falcao ALE, Soares S, Kosour C, Dragosavac D, dkk. Glasgow outcome scale at hospital discharge as a prognostic index in patients with severe traumatic brain injury. Arq Neuropsiquiatr. 2012;70(8):604–8.
7. Sekhon MS, McBeth P, Zou J, Qiao L, Kolmodin L, Henderson WR, Reynolds S, Griesdale DE. Association between optic nerve sheath diameter and mortality in patients with severe traumatic brain injury. Neurocritical Care. 2014;21(2):245–52.
8. Lee B, Newberg A. Neuroimaging in traumatic brain injury. NeuroRx. 2005;2(2):372–83.
9. Moppett IK. Traumatic brain injury: assessment, resuscitation and early management. British J Anaesth. 2007;99(1):18–31.
10. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria head trauma. ACR. 2012;2012:1–6.
11. Novkoski M, Gvozdenovic A, Kelecic M, Gopcevic A, Mazul-Sunko B, Siranovic M. Correlation between skala koma glasgow score and intracranial pressure in patients with severe head injury. Acta Clin Croat. 2001;40:191–5.
12. Marshall LF, Marshall SB, Klauber MR, Clark MB, Eisenberg HM, Jane JA, dkk. A new classification of head injury based on computerized tomography. J Neurosurg. 1991;75(1s):S14–20.
13. Deepika A, Prabhuraj AR, Saikia A, Shukla D. Comparison of predictability of Marshall and Rotterdam CT scan scoring system in determining early mortality after traumatic brain injury. Acta Neurochirurgica. 2015;157(11):2033–8.

14. Legrand A, Jeanjean P, Delanghe F, Peltier J, Lecat B, Dupont H. Estimation of optic nerve sheath diameter on an initial brain computed tomography scan can contribute prognostic information in traumatic brain injury patients. *Crit Care*. 2013;17(2):R61.
15. Sahoo SS, Agrawal D. Correlation of optic nerve sheath diameter with intracranial pressure monitoring in patients with severe traumatic brain injury. *Indian J Neurotrauma*. 2013;10(1):9–12.
16. Waqas M, Bakhshi SK, Shamim MS, Anwar S. Radiological prognostication in patients with head trauma requiring decompressive craniectomy: analysis of optic nerve sheath diameter and Rotterdam CT scoring system. *J Neuroradiol*. 2016;43(1):25–30.
17. Abdalla A, Beshey B, Abougabal A, Elzahaby K. Value of ultrasonographic optic nerve sheath diameter in assessing increased intracranial pressure in patients with moderate to severe traumatic brain injury. *Intensive Care Med Exp*. 2015;3(Supl 1):A488.
18. Soldatos T, Chatzimichail K, Papathanasiou M, Gouliamos A. Optic nerve sonography: a new window for the non-invasive evaluation of intracranial pressure in brain injury. *Emerg Med J*. 2009;26(9):630–4.
19. Sekhon MS, Griesdale DE, Robba C, McGlashan N, Needham E, Walland K, dkk. Optic nerve sheath diameter on computed tomography is correlated with simultaneously measured intracranial pressure in patients with severe traumatic brain injury. *Intensive Care Med*. 2014;40(9):1267–74.
20. Rosenberg JB, Shiloh AL, Savel RH, Eisen LA. Non-invasive methods of estimating intracranial pressure. *Neurocritical Care*. 2011;15(3):599–608.
21. Killer H, Jaggi G, Flammer J, Miller N, Huber A, Mironov A. Cerebrospinal fluid dynamics between the intracranial and the subarachnoid space of the optic nerve. Is it always bidirectional? *Brain*. 2007;130(Pt 2):514–20.
22. Chen H, Ding GS, Zhao YC, Yu RG, Zhou JX. Ultrasound measurement of optic nerve diameter and optic nerve sheath diameter in healthy Chinese adults. *BMC Neurol*. 2015;15(1):106.
23. Ariyurek M, Ozgen A. Normative measurements of orbital structure using CT. *AJR Am J Roentgenol*. 1998;170(4):1093–6.
24. Mena JH, Sanchez AI, Rubiano AM, Peitzman AB, Sperry JL, Gutierrez MI, dkk. effect of the modified glasgow coma scale score criteria for mild traumatic brain injury on mortality prediction: comparing classic and modified glasgow coma scale score model scores of 13. *J Trauma*. 2011;71(5):1185–93.
25. Fink KR. Pathophysiology of traumatic brain injury and impact on management. Dalam: Anzai Y, Fink KR. *Imaging of traumatic brain injury*. New York: Thieme Medical Publisher; 2015. h. 35–46.
26. Blyth BJ, Bazarian JJ. Traumatic alterations in consciousness: traumatic brain injury. *Emerg Med Clin North Am*. 2010;28(3):571–94.

# KORELASI DIAMETER SELUBUNG NERVUS OPTIK DAN MARSHALL CT SCORE DENGAN SKALA KOMA GLASGOW PADA CEDERA KEPALA

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[biomedical-engineering-online.biomedcentral.com](https://www.biomedical-engineering-online.biomedcentral.com)

Internet Source

1%

2

[www.criticalcarehorizons.com](http://www.criticalcarehorizons.com)

Internet Source

1%

3

[www.researchsquare.com](http://www.researchsquare.com)

Internet Source

1%

4

[biomedizin.unibas.ch](http://biomedizin.unibas.ch)

Internet Source

1%

5

[ecommons.aku.edu](http://ecommons.aku.edu)

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

1%

7

[sjtrem.biomedcentral.com](http://sjtrem.biomedcentral.com)

Internet Source

1%

8

[www.einstein.yu.edu](http://www.einstein.yu.edu)

Internet Source

1%

|    |                                                                                                                                                                                                |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9  | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<br>Student Paper                                                                                                                                  | 1 %  |
| 10 | Danang Bagus Untoro, Trijoso Permono, Subandrate Subandrate. "Hubungan Epidural Hematoma Dengan Fraktur Kranium Pada Pasien Cedera Kepala", SRIWIJAYA JOURNAL OF MEDICINE, 2019<br>Publication | 1 %  |
| 11 | Submitted to University of Northampton<br>Student Paper                                                                                                                                        | 1 %  |
| 12 | <a href="http://cris.maastrichtuniversity.nl">cris.maastrichtuniversity.nl</a><br>Internet Source                                                                                              | 1 %  |
| 13 | <a href="http://neurosurgery.directory">neurosurgery.directory</a><br>Internet Source                                                                                                          | 1 %  |
| 14 | Submitted to University of Liverpool<br>Student Paper                                                                                                                                          | 1 %  |
| 15 | <a href="http://journals.sagepub.com">journals.sagepub.com</a><br>Internet Source                                                                                                              | 1 %  |
| 16 | <a href="http://repository-tnmgrmu.ac.in">repository-tnmgrmu.ac.in</a><br>Internet Source                                                                                                      | <1 % |
| 17 | <a href="http://www.intechopen.com">www.intechopen.com</a><br>Internet Source                                                                                                                  | <1 % |
| 18 | <a href="http://biolincc.nhlbi.nih.gov">biolincc.nhlbi.nih.gov</a><br>Internet Source                                                                                                          | <1 % |

- |    |                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 19 | Meydi Ramschie, Olivia C. Pelealu, R. E. C. Tumbel. "TINDAKAN OPERASI THT-KL DI BLU RSUP PROF DR. R.D. KANDOU MALALAYANG", e-CliniC, 2015<br>Publication                                                                     | <1 % |
| 20 | matfromsandy.blogspot.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                 | <1 % |
| 21 | eprints.undip.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                       | <1 % |
| 22 | pubs.rsna.org<br>Internet Source                                                                                                                                                                                             | <1 % |
| 23 | jkb.ub.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                              | <1 % |
| 24 | www.safetylit.org<br>Internet Source                                                                                                                                                                                         | <1 % |
| 25 | Submitted to Imperial College of Science, Technology and Medicine<br>Student Paper                                                                                                                                           | <1 % |
| 26 | ppkdokter2014.blogspot.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                | <1 % |
| 27 | Nirmeen A Kishk, Asmaa M Ebraheim, Amal S Ashour, Nashwa M Badr, Mohamed A Eshra. "Optic nerve sonographic examination to predict raised intracranial pressure in idiopathic intracranial hypertension: The cut-off points", | <1 % |

28

Daniela Cristina dos Santos Faez, Carolina Kosour, Luciana Castilho de Figueiredo, Rodrigo Marques Tonella, Vania Graner Silva Pinto, Desanka Dragosavac, Antonio Luis Eiras Falcao. "Weaning From Mechanical Ventilation in Patients With Severe Head Trauma: A Proposal of Tracheostomy Anticipation", Journal of Neurology Research, 2016

Publication

<1 %

29

[bmcmedicine.biomedcentral.com](http://bmcmedicine.biomedcentral.com)

Internet Source

<1 %

30

Daniel C. Grahf, Sophia I.J. Binz, Tanya Belle, Namita Jayaprakash. "Watching the Brain: an Overview of Neuromonitoring Systems and Their Utility in the Emergency Department", Current Emergency and Hospital Medicine Reports, 2020

Publication

<1 %

31

Muhammad Waqas, Saqib Kamran Bakhshi, Muhammad Shahzad Shamim, Saleha Anwar. "Radiological prognostication in patients with head trauma requiring decompressive craniectomy: Analysis of optic nerve sheath diameter and Rotterdam CT Scoring System", Journal of Neuroradiology, 2016

Publication

<1 %

---

32

Submitted to Queen Mary and Westfield College

Student Paper

<1 %

---

33

Masquère, Pierre, Fabrice Bonneville, and Thomas Geeraerts. "Optic nerve sheath diameter on initial brain CT, raised intracranial pressure and mortality after severe TBI: an interesting link needing confirmation", Critical Care, 2013.

Publication

<1 %

---

34

[www.bib.irb.hr](http://www.bib.irb.hr)

Internet Source

<1 %

---

35

[www.neurores.org](http://www.neurores.org)

Internet Source

<1 %

---

36

Dong Hwan Kim, Jin-Sun Jun, Ryul Kim. "Measurement of the Optic Nerve Sheath Diameter with Magnetic Resonance Imaging and Its Association with Eyeball Diameter in Healthy Adults", Journal of Clinical Neurology, 2018

Publication

<1 %

---

---

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On

# KORELASI DIAMETER SELUBUNG NERVUS OPTIK DAN MARSHALL CT SCORE DENGAN SKALA KOMA GLASGOW PADA CEDERA KEPALA

## GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6