

PENGARUH KEPADATAN UDANG WINDU YANG BERBEDA PADA KONSEP IMTA

by Sri Rejeki

Submission date: 21-Dec-2021 12:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 1734540399

File name: PENGARUH_KEPADATAN_UDANG_WINDU_YANG_BERBEDA_PADA_KONSEP_IMTA.pdf (574.5K)

Word count: 5088

Character count: 28417



Jurnal Sains AkuakulturTropis

Departemen Akuakultur

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275

Telp. (024) 7474698, Fax.: (024) 7474698

Email: sainsakuakulturtropis@gmail.com, sainsakuakulturtropis@undip.ac.id

PENGARUH KEPADATAN UDANG WINDU YANG BERBEDA PADA KONSEP IMTA (INTEGRATED MULTITROPHIC AQUACULTURE) TERHADAP RASIO C/N DALAM MEDIA AIR BUDIDAYA

The Effect of Different Density of Tiger Shrimp on IMTA Concept (Integrated Multitrophic Aquaculture) in Water Media Aquaculture

Asriani Atika Dewi, Sri Rejeki*, Titik Susilowati, Lestari Laksmi Widowati, Restiana Wisnu Ariyati

Departemen Akuakultur

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang – 50275, Telp/Fax. +6224 7474698

*Corresponding author Email: sri_rejeki735@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Budidaya udang windu dengan sistem IMTA yaitu mengkombinasikan dua atau tiga komoditas budidaya, dimana limbah nutrisi/pakan dari hewan tingkat tinggi dikonsumsi oleh hewan tingkat rendah. Budidaya sistem IMTA saat ini belum banyak diketahui nilai C/N dalam memenuhi persyaratan yang optimal. Bakteri heterotrof di perairan akan tumbuh dengan baik apabila rasio C/N bernilai 10 atau lebih. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis rasio C/N dalam air pada budidaya dengan sistem IMTA (*Integrated Multitrophic Aquaculture*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepadatan udang windu terhadap rasio C/N dalam air dan mengetahui kepadatan udang windu yang optimal untuk menghasilkan rasio C/N pada lingkungan budidaya. Udang windu dengan stadia PL-30 (0.92 ± 0.84 cm) dibudidayakan pada sistem IMTA dengan menggunakan ikan nila dengan kepadatan 20 ekor/m³ (0.69 ± 0.3 cm), rumput laut dengan kepadatan 100 g/m² dan kerang hijau dengan kepadatan 90 g/m² (3.32 ± 0.79 cm). Pakan udang windu yang digunakan memiliki kandungan protein 40% dengan metode pemberian pakan secara *fix feeding rate*. Pakan ikan nila yang di[24]akan memiliki kandungan protein 30% dengan metode pemberian pakan yang diberikan secara *ad satiation*. Wadah yang digunakan adalah menggunakan bak fiber dengan ukuran panjang 1 m² dan lebar 1 m² dan kedalaman air 0,7 m². Media yang digunakan untuk membuat sebuah ekosistem yang menyerupai ekosistem tambak ditambahkan substrat berupa pasir berlumpur. Substrat berupa lumpur berpasir mengacu pada penelitian. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 3 ulangan. Kepadatan yang [29]gunakan yaitu perlakuan A (tanpa udang), B (60), C (80), dan D (100). Data yang diamati adalah rasio C/N, laju pertumbuhan spesifik (SGR) dan kelulushidupan (SR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan udang windu yang berbeda pada sistem IMTA berpengaruh ($P < 0.05$) terhadap kelulushidupan tetapi tidak berpengaruh terhadap rasio C/N dan laju pertumbuhan spesifik. Perlakuan kepadatan udang windu 60, 80 dan 100 ekor mempunyai hasil rasio C/N yang baik dalam persyaratan rasio C/N air.

Kata Kunci : IMTA, Kepadatan, Rasio C/N, Udang windu.

ABSTRACT

Tiger shrimp cultured with the IMTA concept that combines two or three commodities, while aquaculture waste feed [18]m higher animals is consumed by lower animals. Cultured with the IMTA concept hasn't w[18]y known the C/N ratio to fill the optimal requirements. Heterotrophic bacteria in the transfer will grow well with the C/N ratio of 10 or more. Therefore, need to analyze the C/N ratio water in aquaculture with the IMTA concept

8

(Integrated Multitrophic Aquaculture). The purpose of this study was to test the effect of density on the C/N ratio in water and to know the optimal density of tiger shrimps to produce best C/N ratio in the aquaculture environment. Tiger shrimp with PL-30 (0.092 ± 0.84) stage was cultivated on the IMTA concept by 17 g tilapia with a density of 20 fish/m³ (0.69 ± 0.83 g), seaweed with a density of 100 g/m² and green mussels with a density of 90 g/m² (3.32 ± 0.79 g). Tiger shrimp feed used contains 40% protein with feeding method using fix feeding rate method. The tilapia food used contains 30% protein with the feeding method using ad satiation method. The tank used fiber tub with size 1 m² length and 1 m² width and depth of water was 0.6 m². The media used to make the ecosystem added to the pond ecosystem was a substrate of muddy sand. The experimental design was used Completely Randomized Design (RAL) 4 treatments and 3 replicates. The density were A (without shrimp), B (60), C (80), and D (100). Data were observed were the C/N ratio, specific growth rate (SGR), 15 survival rate (SR). The results showed that difference density of tiger shrimp with the IMTA concept gave significant effect ($P<0.05$) on SR and was not significant ($P>0.05$) on C/N ratio and SGR. The treatment of tiger shrimp, 60, 80 and 100 shrimp densities have a good C/N ratio results in the water C/N ratio requirements.

Keywords: IMTA, Density, C/N ratio, Tiger Shrimp.

PENDAHULUAN

Budidaya udang windu dengan sistem IMTA yaitu mengkombinasikan dua atau tiga komoditas budidaya, dimana limbah nutrisi/pakan dari hewan tingkat tinggi dikonsumsi oleh hewan tingkat rendah. Kombinasi integrasi ini dapat dilakukan dengan menggabungkan budidaya ikan atau udang dengan rumput laut dan kekerangan, dimana selain dapat mengkonsumsi limbah nutrisi pakan ikan budidaya, rumput laut dan kekerangan juga dapat menyerap 5nbah untuk meningkatkan laju pertumbuhan (Chopin dan Robinson, 2004). Menurut Yuniarrah et al. (2014) komoditas yang dipilih untuk IMTA disesuaikan dengan fungsinya dalam ekosistem dan merupakan komoditas dengan nilai ekonomis yang penting. Bila pemilihan spesies budidaya benar, maka sistem IMTA ini akan mereduksi kandungan organik dan anorganik nitrogen dan karbon dalam air dan tanah.

Usaha budidaya udang diperlukan persyaratan budidaya udang yang harus dipenuhi. Salah satu syarat penting untuk budidaya udang yaitu kandungan C/N ratio pada perairan. Pada budidaya udang, ikan nila, rumput laut dan kerang hijau dengan sistem IMTA saat ini belum diketahui nilai C/N dalam memenuhi persyaratan yang baik. Menurut Avnimelech (1999) bahwa heterotrof di perairan akan tumbuh dengan baik apabila rasio C/N bernilai 10 atau lebih. Hubungan rasio C/N dengan mekanisme kerja bakteri yaitu mendapatkan makanan melalui substrat karbon dan nitrogen dalam perbandingan tertentu. Bakteri dapat bekerja secara optimal untuk menguraikan N-anorganik yang beracun menjadi N-anorganik yang tidak beracun sehingga dapat mempertahankan kualitas air dan biomass bakteri dapat bermanfaat sebagai sumber protein bagi kultivan. Sehingga hal ini juga dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi pakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepadatan udang terhadap rasio C/N dalam air dan mengetahui 38 rasio optimal untuk menghasilkan rasio C/N yang optimal pada lingkungan budidaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Juli 2019 di Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Meliputi persiapan alat dan media pemeliharaan selama 14 hari dan pelaksanaan pengumpulan data selama 30 hari.

MATERI 30 METODE PENELITIAN

Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini benih udang windu (*Penaeus monodon*) dengan stadia PL-30 yang memiliki panjang 1.83 ± 0.63 cm, benih ikan nila gesit (*Oreochromis sp.*) yang memiliki panjang 3.21 ± 0.68 cm, kerang hijau (*Perna viridis*) yang memiliki panjang 3.4 ± 0.71 cm dan rumput laut *Gracilaria verrucosa*. Udang windu merupakan organisme utama pada penelitian ini. Benih udang windu yang digunakan berasal dari pembudidaya di Karangtengah, Demak. Ikan nila merupakan organisme sekunder pada penelitian ini. Benih ikan nila didapatkan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dengan jenis ikan nila gesit (*Genetically Supermale Indonesian Tilapia*). Rumput laut dan kerang hijau sebagai organisme biofilter dan penyeimbang ekosistem. Rumput laut juga didapatkan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dengan jenis *Glacilaria verrucosa* dan kerang hijau didapatkan dari perairan karang tengah Demak. Kepadatan ikan nila 20 ekor yang mengacu pada penelitian Sri-uam et al. (2016) dengan menggunakan kepadatan ikan nila sebesar 20 ekor. Kepadatan rumput laut yaitu 100 gram/m³ mengacu pada Rejeki et al. (2015) dengan menggunakan rumput laut sistem IMTA sebesar 0,1 kg/m³ dan kepadatan kerang hijau 90 gram/m³ yang mengacu pada penelitian Aliah et al., (2017) dengan menggunakan rumput laut dan kerang hijau masing masing yaitu 1200 g dan 1080 g.

Pakan udang windu yang digunakan selama proses penelitian adalah pellet dengan kandungan protein 40%. Pakan yang diberikan pada udang windu sebanyak 5% dari bobot biomassa dengan metode pemberian pakan secara

fix feeding rate. Frekuensi pemberian pakan dan jumlah pakan udang windu mengacu penelitian Lante *et al.* (2015), metode pemberian pakan udang windu dilakukan dengan metode fix feeding rate. Pakan ikan nila yang digunakan dengan kandungan protein 30% dengan metode pemberian pakan yang diberikan secara ad satiation. Frekuensi pemberian pakan dan jumlah pakan ikan nila mengacu penelitian Mulyani *et al.*, (2014), metode pembe³³pakan ikan nila dilakukan dengan metode ad satiation.

Wadah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bak fiber ukuran panjang 1 m² dan lebar 1 m² dengan kedalaman air 0,7 m² mengacu pada penelitian Susilowati *et al.* (2017) kedalaman air udang windu yaitu >70 cm. Media yang digunakan untuk membuat sebuah ekosistem yang menyerupai ekosistem tambak ditambahkan substrat berupa pasir berlumpur. Substrat berupa lumpur berpasir mengacu pada penelitian Sandoval *et al.*, (2014), *Penaeus monodon* berkembang biak secara dominan pada substrat pasir berlumpur yang dekat dengan³⁵ bibit laut.

Alat yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah botol sampel untuk wadah air sampel yang akan diuji untuk mengetahui kandungan amoniak, nitrit, nitrat, fosfat, karbon organik dan nitrogen organik, kemudian timbangan digital yang digunakan untuk menimbang bobot benih udang windu dan rumput laut, dan ikan Nila, jangka sorong yang digunakan untuk mengukur panjang udang windu²³ dan kerang hijau, selang dan aerator sebagai penyuplai oksigen. Alat lain yang digunakan adalah refraktometer yang⁴⁶ gunakan untuk mengukur salinitas, pH meter digunakan untuk mengukur pH, water quality checker digunakan untuk mengukur kandungan oksigen yang terkandung⁴ dalam air dan digunakan untuk mengukur suhu air.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 kali ulangan. Penelitian ini menggunakan budidaya dengan³² sistem IMTA (*Integrated Multitrophic Aquaculture*) yaitu udang windu, ikan nila, rumput laut dan kerang hijau. Perlakuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

Perlakuan A: tanpa udang windu (kontrol)

Perlakuan B: Udang windu dengan kepadatan 60 gr/m³

Perlakuan C: Udang windu dengan kepadatan 80 gr/m³

Perlakuan D: Udang windu dengan kepadatan 100 gr/m³

Pengumpulan data

41

Data yang dikumpulkan meliputi Rasio C/N dan pengukuran kualitas air berupa oksigen terlarut, suhu, pH, salinitas, fosfat, amoniak dan nitrat:

a. Rasio C/N Air Media Budidaya

Pengukuran rasio C/N dilakukan dengan menghitung perbandingan nilai C organik dan nitrogen organik yang telah diperoleh dari hasil analisis. Perhitungan rasio C/N dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mlangeni *et al.*, 2013):

$$\text{Rasio C/N} = \frac{\text{C organik}}{\text{N organik}}$$

Keterangan : C = nilai C organik
N = nilai N organik

b. Kualitas Air

Pengamatan Pengamatan kualitas air meliputi oksigen terlarut (n³⁴), suhu (°C), pH, salinitas (ppt), kandungan amoni²⁶ (mg/l), nitrat (mg/l), dan fosfat (mg/l). Pengamatan kualitas air yang meliputi suhu, pH, salinitas, dan DO dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari, dengan³⁷ menggunakan Water Quality Checker. Pengukuran kandungan karbon organik dan nitrogen organik pada setiap 10 hari sekali selama 30 hari pemeliharaan ikan.

21

Analisis Data

Rancangan penelitian⁴⁴ digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL). Hasil data rasio C/N, pertumbuhan bobot mutlak, laju pertumbuhan relatif, laju pertumbuhan spesifik, dan kelulushidupan yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara statistik. Data tersebut diuji dengan uji normalitas, uji homogenitas dan uji⁴⁰ litivitas. Apabila pada ketiga uji tersebut menunjukkan data terdistribusi normal, bersifat homogen dan aditif maka dilanjutkan analisis ragam (ANOVA) untuk meng⁴² uji perlakuan yang diterapkan berpengaruh atau tidaknya terhadap rasio C/N. ¹⁴ Jika analisis ragam diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,0³⁹) maka dilakukan uji wilayah ganda Duncan untuk mengetahui perbedaan nilai tengah antar perlakuan. Data kualitas air seperti oksigen terlarut (DO), Suhu, pH, salinitas, fosfat, amoniak dan nitrat dianalisis secara deskriptif.

HASIL

a. Rasio C/N Air Media Budidaya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil uji C organik dan N organik yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Data C organik dan N organik dalam Media Air Budidaya.


Perlakuan	C organik (ppm)		N organik (ppm)	
	Awal	Akhir	Awal	Akhir
A	11,40	35,90	4,55	2,63
B	11,40	39,40	4,55	3,03
C	11,40	37,07	4,55	2,57
D	11,40	25,40	4,55	2,45

Berdasarkan Tabel 1, hasil yang telah diperoleh dari hasil uji kandungan C organik dan N organik paling tinggi pada perlakuan B ($C=39,40 \text{ ppm}$ $N=3,03 \text{ ppm}$), diikuti perlakuan C ($C= 37,07 \text{ ppm}$ $N=2,57 \text{ ppm}$), perlakuan A ($C=35,90 \text{ ppm}$ $N=2,63 \text{ ppm}$) dan perlakuan D ($C=25,40 \text{ ppm}$ $N=2,45 \text{ ppm}$).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil data rasio C/N yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Rasio C/N dalam Media Air Budidaya

Perlakuan	Rasio C/N		
	Awal	Akhir	$\Delta C/N$
A	2,51	14,34	11,34
B	2,51	13,20	2,62
C	2,51	14,95	2,63
D	2,51	11,47	5,38

Berdasarkan Tabel 2, hasil yang telah diperoleh pada awal pemeliharaan sebesar 2,51 kemudian pada akhir pemeliharaan didapatkan rasio C/N paling tinggi pada perlakuan C sebesar 14,95 diikuti perlakuan A sebesar 14,34, diikuti oleh perlakuan B sebesar 13,20 dan diikuti oleh perlakuan D sebesar 11,47. Hasil analisis ragam nilai derajat pembuahan tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Histogram hasil analisis ragam Rasio C/N

Hasil dari uji analisis ragam diketahui bahwa kepadatan udang windu yang berbeda memberikan hasil berpengaruh nyata bahwa F hitung lebih besar dari F tabel terhadap rasio C/N air dalam media budidaya.

Kualitas air

Kisaran pengukuran kualitas air harian yang dilakukan selama 30 hari penelitian meliputi oksigen terikat (DO), Suhu, pH, salinitas, fosfat, amoniak dan nitrat pada pemeliharaan udang windu (*P. monodon*) disajikan pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil Pengukuran Nilai Kualitas Air pada Media Budidaya Udang Windu

Perlakuan	Variabel						
	DO(mg/l)	Suhu(°C)	pH	Salinitas(ppt)	Fosfat(mg/l)	Amoniak(mg/l)	Nitrat(mg/l)
A	2,6 – 6,8	25-30	7,4-8,9	23-35	0,29-2,1	0,04-1,18	1,11-3,93
B	3-6,6	25-30	8-8,8	22-30	0,29-0,98	0,1-0,98	1,56-3,93
C	3-6,3	24-30	7,8-8,8	23-31	0,3-0,98	0,1-0,63	1,66-3,93
D	4,2-6,8	25-31	7,8-8,7	21-31	0,45-1,03	0,39-0,48	1,9-4,87
Kelayakan	>4 ^a	26-32 ^b	7-8,7 ^c	10-35 ^e	0,1-5 ^a	<0,1 ^a	0,9-3,5 ^d

Keterangan : a. PERMEN-KP (2016)
b. Rachmansyah *et al.* (2010)
c. Mariska (2002)
d. Amri (2003)
e. Schimittou (1991)

PEMBAHASAN

1. Rasio C/N Air pada Media Budidaya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perlakuan padat tebar yang berbeda terhadap pengaruh nyata dari perlakuan terhadap rasio C/N air. Pada semua perlakuan, rasio C/N air pada akhir penelitian mengalami peningkatan dibandingkan rasio C/N pada awal penelitian. Pada awal penelitian didapatkan rasio 2,51. pada akhir penelitian, rasio C/N semakin meningkat dengan nilai berkisar antara 11,47-14,95. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rasio C/N air media budidaya udang windu yang dibudidayakan dengan sistem *Integrated Multitrophic Aquaculture* dengan kepadatan 60, 80 dan 100 masih memenuhi persyaratan budidaya. Menurut Beristain (2005) bahwa karbon dan nitrogen merupakan kesatuan yang telah ditetapkan sebagai pembentuk jaringan biomassa bakteri, perbandingan C:N yang optimal yaitu diatas 10 pada kondisi aerobik.

Berdasarkan uji analisis ragam yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa kepadatan udang windu yang berbeda hasil berpengaruh nyata terhadap rasio C/N air media budidaya. Rasio C/N yang terbaik yaitu pada perlakuan D yaitu sebesar $5,38 \pm 4,6$. Rasio C/N yang yang didapat dari semua perlakuan dengan sistem IMTA yaitu lebih dari 10 yang berarti sel bakteri yang dihasilkan dapat di manfaatkan oleh udang sebagai sumber protein. Oleh karena itu, rasio C/N yang dihasilkan dapat menghemat pakan (efisiensi pakan). Hal ini diperkuat oleh Avnimelech (1999) bahwa bakteri dapat bekerja secara optimal untuk menguraikan N-anorganik yang beracun menjadi N-anorganik yang tidak beracun sehingga dapat mempertahankan kualitas air dan biomass bakteri dapat bermanfaat sebagai sumber protein bagi kultivan. Sehingga hal ini juga dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi pakan. Hal ini juga diperkuat oleh Martini (2017) yang menyatakan bahwa sistem yang mendukung pengelolaan limbah dan daur ulang protein pakan berpotensi menawarkan berkelanjutan dan kompatibilitas lingkungan yang lebih baik bagi komunitas budidaya udang.

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian berlangsung ditemukan beberapa sisa pakan di dasar kolam setelah beberapa jam pemberian pakan. Penumpukan sisa pakan yang tidak termanfaatkan dapat menyebabkan meningkatnya karbon organik. Hal ini diperkuat oleh Suwoyo *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa pakan udang mengandung protein lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat, rasio C:N dari pakan sekitar 9:1. Hal ini juga diperkuat oleh Avnimelech (2009) yang menyatakan bahwa pada kondisi rasio C:N dilingkungan tinggi, bakteri heterotrof akan tumbuh dengan pesat dan akan mengasimilasi amoniak (nitrogen anorganik) menjadi nitrogen organik (protein) dalam bentuk biomassa bakteri yang tidak bersifat toksik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa nilai karbon organik semakin meningkat sejalan dengan aktivitas budidaya. Nilai karbon organik dapat disebabkan oleh kebutuhan pakan kultivan yang seiring dengan pertumbuhan biomassanya. Menurut Avnimelech *et al.*, (2001), pemberian pakan yang tinggi akan dapat menyebabkan peningkatan hasil metabolisme dan dekomposisi bahan-bahan organik pada sedimen tambak. Sehingga meningkatnya karbon dalam media budidaya merupakan cara yang paling efektif menurunkan nitrogen anorganik. Menurut Davies (2005), rasio C:N yang tinggi (>15) akan merangsang bakteri heterotrof untuk mengasimilasi

ammonium nitrogen dari air menjadi biomassa sel bakteri.

Adanya budidaya sistem budidaya *Integrated Multitrophic Aquaculture* (IMTA) nilai karbon organik meningkat, sehingga apabila dibandingkan dengan nilai nitrogen organik tersebut nilai rasio C/N dapat menjadi seimbang sehingga dalam hal ini budidaya udang windu yang menggunakan sistem IMTA memenuhi persyaratan dalam budidaya udang windu. Masithah *et al.* (2016) menduga bahwa nilai rasio C/N yang tidak mencapai 10 dikarenakan aktivitas bakteri dalam proses degradasi dalam menghasilkan C₁₂N serta kebutuhan C dan N untuk proses pertumbuhan bakteri. Menurut Schneider *et al.* (2005), amoniak dan limbah organik nitrogen akan dikonversi menjadi biomassa bakteri heterotrof apabila terjadi keseimbangan antara karbon organik dan nitrogen. Menurut Assaduzzaman *et al.* (2008), keseimbangan rasio C/N dapat mengubah autrotrofik ke sistem heterotrofik untuk mensintesis protein bakteri dan sel-sel baru, sehingga dapat digunakan sebagai sumber makanan oleh ikan mas, nila atau udang. Menurut Boyd (1998), sistem autrotrof didominasi oleh alga (fitoplankton) menggunakan nitrogen anorganik dalam bentuk NH₄⁺ dan NO₃⁻ dengan cara memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi sehingga pertumbuhan fitoplankton juga bergantung pada ketersediaan sinar matahari.

Proses penguraian bahan organik dalam lingkungan budidaya dapat mempengaruhi keberadaan nitrogen. Nitifikasi mengubah amoniak menjadi nitrit dan nitrat sedangkan denitrifikasi akan mereduksi nitrat menjadi gas N₂ yang akhirnya dapat dilepaskan dari kolom air. Hal ini diperkuat oleh Indrayani *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa unsur penting yang ¹⁹t mempengaruhi kesediaan nutrien yaitu nitrogen dan karbon. Hal ini karena unsur tersebut mempunyai peran penting dalam pembentukan komposisi dan biomassa fitoplankton yang akan menentukan produktivitas primer. Menurut Hartoto *et al.* (1998), nitrogen berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan protein oleh fitoplankton dalam bentuk amoniak atau nitrat. Menurut Hadisusanto (2006), kandungan karbon organik berhubungan dengan pergerakan materi organik di dalam perairan, dengan kisaran 1-30 ppm di perairan alami.

2. Kualitas Air

9

1

Berdasarkan hasil penelitian nilai kandungan oksigen terlarut pada perlakuan A berkisar antara 2,6-6,8 mg/l, pada perlakuan B ⁴⁵ ar antara 3-6,6 mg/l, pada perlakuan C berkisar antara 3-6,3 mg/l dan pada perlakuan D berkisar antara 4,2-6,8 mg/l. Nilai oksigen terlarut pada perlakuan A, B dan C tergolong kurang layak digunakan untuk budidaya udang windu (*P. monodon*) karena hasil tersebut kurang dari nilai kelayakan yaitu >4 mg/l. Kadar oksigen terlarut (DO) yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan udang windu kurang optimal. Menurut Boyd (1998), nilai oksigen terlarut (>4 mg/l) dapat menyebabkan pertumbuhan lambat, nafsu makan turun, dalam kondisi yang lemah bahkan dapat menyebabkan kematian dan dapat merangsang pertumbuhan bakteri anaerob didasar kolam. Kandungan DO 5 mg/L sampai dengan saturasi merupakan nilai yang optimal untuk pertumbuhan kultivan. Menurut Radiarta dan Erlania (2015), oksigen terlarut pada kondisi saturasi dapat dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan ketinggian perairan dari permukaan laut ³ altitude, apabila suhu, salinitas, dan ³ altitude semakin tinggi maka kelarutan oksigen akan semakin berkurang. Kadar oksigen terlarut yang berfluktuasi secara harian dan musiman bergantung pada percampuran (mixing) dan pergerakan (turbulence) massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi, dan limbah (effluent) yang masuk ke badan air.

Nilai suhu pada perlakuan A berkisar antara 25-30 °C, pada perlakuan B berkisar antara 25-30 °C, pada perlakuan C berkisar antara 24-30 °C dan pada perlakuan D berkisar antara 25-31. Nilai tersebut tergolong layak digunakan untuk budidaya udang windu (*P. monodon*) dikarenakan masih dalam kisaran optimal. Menurut Pratama *et al.* (2017), suhu air dapat mempengaruhi sintasan, pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, pergantian kulit dan metabolisme.

Nilai pH (derajat keasaman) pada perlakuan A berkisar antara 7,4-8,9, pada perlakuan B berkisar antara 8-8,8, pada perlakuan C berkisar antara 7,8-8,8 dan pada perlakuan D berkisar antara 7,8-8,7. Nilai pH yang diperoleh selama pemeliharaan tersebut tergolong digunakan untuk pemeliharaan udang windu (*P. monodon*). Menurut Supono (2015) ikan dan vertebrata lain akan tumbuh optimal apabila pH air sekitar 6,5-9. Pada pH 4-5 akan ikan akan mengalami stress yang mengakibatkan pertumbuhan lambat dan produktivitas kolam rendah serta pada pH 10 ikan dan vertebrata lain akan mengalami kematian.

Nilai salinitas pada perlakuan A berkisar antara 23-35 ppt, pada perlakuan B berkisar antara 22-30 ppt, pada perlakuan C berkisar antara 23-31 dan pada perlakuan D berkisar antara 21-31 ppt. Nilai tersebut tergolong layak digunakan untuk budidaya udang windu (*P. monodon*). Menurut Haliman dan Adijaya (2005), salinitas air yang terlalu tinggi menyebabkan udang kesulitan untuk molting karena kulit cenderung keras.

Nilai fosfat pada perlakuan A berkisar antara 0,29-2,1 mg/l, pada perlakuan B berkisar antara 0,29-0,98 mg/l, pada perlakuan C berkisar antara 0,3-0,98 mg/l dan pada perlakuan D berkisar antara 0,45-1,03 mg/l. Nilai fosfat tersebut tergolong layak digunakan untuk budidaya udang windu pada sistem IMTA. Menurut Masyaroh dan Mappiratu (2010), rumput laut membutuhkan nutrien seperti nitrat dan fosfat. Nitrat dibutuhkan oleh rumput laut untuk pertumbuhan sedangkan fosfat dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan, mempercepat dan

memperkuat tanaman.

Nilai kandungan amoniak pada perlakuan A berkisar antara 0,04-1,18 mg/l, pada perlakuan B berkisar antara 0,98-0,1 mg/l, pada perlakuan C berkisar antara 0,63-0,1 mg/l dan pada perlakuan D berkisar antara 0,39-0,48 mg/l. Nilai amo¹⁰ tinggi diduga dapat menyebabkan rendahnya nilai rasio C/N. Menurut Ismayana *et al.* (2012), apabila nilai C/N terlalu rendah maka akan banyak mengandung amoniak yang dihasilkan oleh bakteri amoniak. Senyawa ini dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi nitrit dan nitrat yang diserap oleh tanaman. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan rumput laut dalam sistem IMTA yang dapat berperan dalam mengurangi nilai amoniak tersebut.

Nilai kandungan nitrat pada perlakuan A berkisar antara 1,11-3,93 mg/l, pada perlakuan B berkisar antara 1,56-3,93 mg/l, pada perlakuan C berkisar antara 1,66-3,93 mg/l dan pada perlakuan D berkisar antara 1,9-4,87 mg/l. Nilai kandungan nitrat masih tergolong kisaran optimum dalam budidaya udang¹³ indu. Hal ini tingginya nilai nitrat tidak bersifat racun terhadap kultivan. Menurut Mustafa dan Admi (2014) nitrat adalah bentuk utama N di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga akuatik.

2 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Perlakuan kepadatan udang windu yang berbeda pada budidaya dengan sistem IMTA (*Integrated Multitrophic aquaculture*) berpengaruh terhadap rasio C/N ($P>0,05$). Perendaman larutan telur hijau dengan berbagai dosis memberikan pengaruh nyata ($P<0,05$) terhadap derajat pembuahan ikan patin (*Pangasius* sp.). Perlakuan C dengan dosis 6 gr/L merupakan dosis terbaik yang dapat digunakan untuk menghilangkan adhesifitas telur ikan patin siam. Hasil menunjukkan nilai derajat pembuahan sebesar $21,23\pm0,44\%$. Pada perlakuan kepadatan udang windu 60, 80 dan 100 ekor mempunyai rasio C/N yang baik dalam menghasilkan rasio C/N.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah Sebaiknya menggunakan padat penebaran udang windu 100 ekor/m³ pada budidaya dengan sistem IMTA dan sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan dengan kultivan lain dalam sistem IMTA yang menghasilkan keseimbangan rasio C/N.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada *Project to Design Aquaculture Supporting Mangrove Forest in Indonesia* (PASMI) yang telah memberikan dukungan sarana dan prasana serta finansial dalam melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, R., S., dan S. I., Sachoemar. 2017. Pengembangan Prototipe Teknologi Budidaya Ikan Nila Unggul Terintegrasi di Lingkungan Perairan Tambak. Jurnal Rekayasa Lingkungan. 10(1): 1-8.
- Avnimelech, Y. 1999. Carbon/Nitrogen Ratio As A Control Element in Aquaculture Systems. Journal of Aquaculture. 176:227-235.
- Avnimelech Y, Ritvo G, Meijer LE, Kochba M. 2001. Water Content, Organic Carbon and Dry Bulk Density in Flooded Sediment. Journal Agricultural Engineering 25:25-23.
- Avnimelech, Y. 2009. Biofloc Technology – A Practical Guide Book. The World Aquaculture Society. Baton Rounge. Lousiana. Unite State. 182 hlm.
- Beristain, T.B. 2005. Organic Matter Decomposition in Simulated Aquaculture Ponds. Wageningen Institute of Animal Science. Netherlands. 138 hlm.
- Boyd. 1998. Water Quality for Pond Aquaculture Pub. International Center for Aquaculture and Aquatic Environments. Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University. USA. 37 hlm.
- Chopin, T. and Robinson, 2004. Defining the Appropriate Regulatory and Policy Framework for the Development of Integrated Multi-Trophic Aquaculture Practices. Journal Aquaculture Association of Canada. 104(3): 4-10.
- Davies, P. S. 2005. The Biological Basis of Waste Water Treatment. Strathkelvin Instrument Ltd. 19 hlm.
- Hadisusanto, S. 2006. Distribusi dan Kelimpahan Larva Bentonik Chironmidae (Diptera): Hubungannya dengan Jeluk dan Nutrien di Waduk Sempor, Kebumen, Jawa Tengah. DISERTASI. Universitas Gajahmada. Yogyakarta.

- Haliman, R. W. dan Adijaya, D.S. 2005. Udang Vannamei. Penebaran Swadaya; Jakarta. 75 hlm.
- Indrayani, E. Kamiso, H.N., Suwarno, H. dan Rustadi. 2015. Analisis Kandungan Nitrogen, Fosfor dan Karbon Organik di Danau Sentani Papua. Jurnal Manusia dan Lingkungan. 22(2): 217-225.
- Ismayana, A., Nastiti, S. I., Suprihatin, Akhiruddin, M., dan Aris, F. 2012. Faktor Rasio C/N Awal dan Laju Aerasi pada Proses *Co-composting Bagasse* and Blotong. Jurnal Teknologi Industri Pertanian. 22(3): 173-179.
- Mariska, R. 2002. Keberadaan Bakteri Probiotik dan Hubungannya dengan Karakteristik Kimia Air dalam Kondisi Laboratorium. IPB. Bogor
- Martini, N. N. D. 2017. Pengaruh Perbedaan Sistem Budidaya terhadap Laju Pertumbuhan Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*). Jurnal IKA. 15(1): 1-20.
- Masithah, E. D., Yurika, D. O., dan Abdul M. 2016. Pengaruh Perbedaan Probiotik Komersial terhadap Rasio C:N dan N:P Media Kultur Bioflok pada Bak Percobaan. Journal of Aquaculture and Fish Health. 5(3):118-125.
- Mlangeni, A.N.J.T., Samson S., dan Sosten S.C. 2013. Total Kjeldahl-N, Nitrate-N, C/N Ratio and pH Improvements in Chimato composts Using *Tithonia Diversifolia*. Journal of Agricultural Science. 5(10): 1-9.
- Mustafa, A., dan Admi A. 2014. Aplikasi Analisis Jalur dalam Penentuan Pengaruh Kualitas Tanah dan Air terhadap Produksi Total Tambak di Kabupaten demak, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Kelautan Nasional. 9(2): 65-79.
- PERMEN Perikanan dan Kelautan No. 75. 2016. Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Penaeus monodon*) dan Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*). 43 hlm
- Pratama, A., Wardiyanto dan Supono. 2017. Studi Performa Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) yang Dipelihara dengan Sistem Semi Intensif pada Kondisi Air Tambak dengan Kelimpahan Plankton yang Berbeda pada Saat Penebaran. Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan. 6(1): 643-651.
- Radiarta, I. N., dan Erlania. 2015. Indeks kualitas Air dan Sebaran Nutrien Sekitar Buidaya Laut Terintegrasi di Perairan Teluk Ekas, Nusa Tenggara Barat: Aspek Penting Budidaya Rumput Laut. 10(1): 141-152.
- Rachmansyah, Ahmad, M., dan Mudin, P. 2010. Karakteristik, Kesesuaian dan Pengelolaan Lahan Tambak di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Riset Akuakultur. 5(3): 505-521.
- Rejeki, S., Restiana W. A., dan Lestari L.W. 2016. Application of Integrated Multi Tropic Aquaculture Concept in an Abraded Brackish Water Pond. Journal of Technology. 78:(4): 227-232.
- Sandoval, L. A., J. L. Florez., A. Taborda dan J. G. Vasquez. 2014. Spatial Distribution and Abundance of The Giant Tiger Prawn, *Penaeus monodon* (Fabricius, 1798), in the Gulf of Uraba (Caribbean). Jurnal Bioinvasions. 3(3): 169-173.
- Schneider, O., Sereti, V., Eding, E.H. and Verreth, J. A. J. 2005. Analysis of Nutrient Flows in Integrated Intensive Aquaculture Systems. Aquaculture Engineering. 32: 379-401.
- Sri-uam, Puchong, Seri d., Sorawit, P., dan Prasert, P. 2016. Integrated Multi-trophic Recirculating Aquaculture System for Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*). 8(7): 1-15.
- Supono. 2015. Manajemen Lingkungan untuk Akuakultur. Plantaxia; Jogjakarta.
- Susilowati, T., Tristiana, Y., dan Fajar, B. 2017. Penggunaan Reservoir terhadap Performa Udang Windu (*Penaeus monodon* Fabricius) yang Dibudidayakan Secara Tradisional. Jurnal Saintek Perikanan. 13(1): 52-57.
- Suwoyo, H.S., Abdul M., dan Gunarto. 2012 Penggunaan Sumber Karbon Organik pada Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) dengan Teknologi Bioflok. Prosiding Indoqua-Forum Inovasi Teknologi Akuakultur. 91-103.
- Yuniarsih, E., Nirmala, K., dan Radiata, I. N. 2014. Tingkat Penyerapan Nitrogen dan Fosfor pada Budidaya Rumput Laut Berbasis IMTA (*Integrated Multi-Throphic Aquaculture*) di Teluk Gerupuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Riset Akuakultur. 9(3): 487-501.

PENGARUH KEPADATAN UDANG WINDU YANG BERBEDA PADA KONSEP IMTA

ORIGINALITY REPORT

17 %	%	17 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Rosa Samhari, Hastiadi Hasan, Eka Indah Raharjo. "PENGARUH PEMBERIAN KALSIK DENGAN KADAR YANG BERBEDA TERHADAP PERKEMBANGAN POPULASI Daphnia sp.", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2014 | 2 % |
| 2 | Perdi Afriansyah, Rosmawati Rosmawati, Fia Sri Mumpuni. "Penggunaan Tepung Gandum Sebagai Sumber Karbon Pada Pengangkutan Benih Ikan Nila (Oreochromis niloticus)", JURNAL MINA SAINS, 2016 | 1 % |
| 3 | I Nyoman Radiarta, Erlania Erlania. "INDEKS KUALITAS AIR DAN SEBARAN NUTRIEN SEKITAR BUDIDAYA LAUT TERINTEGRASI DI PERAIRAN TELUK EKAS, NUSA TENGGARA BARAT: ASPEK PENTING BUDIDAYA RUMPUT LAUT", Jurnal Riset Akuakultur, 2015 | 1 % |
- Publication
- Publication
- Publication

- 4 Anjas adi Santoso, Muarif Muarif, Rosmawati Rosmawati. "THE INFLUENCE OF STOCKING DENSITY AGAINST SURVIVAL RATE OF CATFISH (*Clarias gariepinus*) ON RECIRCULATION SYSTEM", JURNAL MINA SAINS, 2018 1 %
Publication
-
- 5 I Nyoman Radiarta, Erlania Erlania. "PERFORMA KOMODITAS BUDIDAYA LAUT PADA SISTEM INTEGRATED MULTI-TROPHIC AQUACULTURE (IMTA) DI TELUK GERUPUK, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT", Jurnal Riset Akuakultur, 2016 1 %
Publication
-
- 6 Arif Wijaya Rahman, Muarif Muarif, Mulyana Mulyana. "KEPADATAN BAKTERI PADA MEDIA PEMELIHARAAN IKAN GURAMI (*Osphronemus gouramy*) DENGAN SISTEM BIOFLOK DAN PENAMBAHAN PROTEIN YANG BERBEDA", JURNAL MINA SAINS, 2020 1 %
Publication
-
- 7 Berta Putri, Siti Hudaidah, Widi Indra Kesuma. "PEMANFAATAN BUNGKIL INTI SAWIT SEBAGAI MEDIA PERTUMBUHAN CACING SUTRA (*Tubifex sp.*)", e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, 2018 1 %
Publication
-

- 8 Supono Supono, Hani Taqiyatin, Esti Harpeni. Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2020 1 %
Publication
-
- 9 Eko Prasetio, Eka Indah Raharjo, Ispandi .. "PENGARUH PADAT TEBAR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN JELAWAT (*Leptobarbus hoeveni*)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2017 1 %
Publication
-
- 10 Venus Nikiyuluw, Rudy Soplanit, Adelina Siregar. "Efisiensi Pemberian Air dan Kompos Terhadap Mineralisasi NPK Pada Tanah Regosol", JURNAL BUDIDAYA PERTANIAN, 2018 1 %
Publication
-
- 11 Agung Syahfrizal, Suri Purnama Febri, Muhammad Fauzan Isma, Teuku Fadlon Haser. "Bahasa Indonesia", Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2021 <1 %
Publication
-
- 12 Usman Usman, Neltje Nobertine Palinggi, Enang Harris, Dedi Jusadi, Eddy Supriyono. "PENGARUH MANAJEMEN PEMBERIAN PAKAN TERHADAP PEMANFAATAN BIOFLOK UNTUK <1 %

PERTUMBUHAN IKAN BANDENG", Jurnal Riset
Akuakultur, 2011

Publication

-
- 13 Akhmad Mustafa, Admi Athirah. "APLIKASI ANALISIS JALUR DALAM PENENTUAN PENGARUH KUALITAS TANAH DAN AIR TERHADAP PRODUKSI TOTAL TAMBAK DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH", Jurnal Kelautan Nasional, 2014 <1 %
Publication
-
- 14 Ditto Satria Pembudi, Baginda Iskandar Muda Tampoebolon, Surahmanto Surahmanto. "Pengaruh Perbedaan Aras Starter Aspergilus Niger Pada Proses Amofer Sekam Padi Terhadap Kandungan Lignin, Selulosa Dan Hemiselulosa", Jurnal Penelitian Peternakan Terpadu, 2019 <1 %
Publication
-
- 15 A A Muhamadar, M A Chaliluddin, D F Putra, M S Asmawati. "Study of probiotics of yeast and lactic acid bacteria in feeding on culture of larvae shrimp (*Penaeus monodon*)", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018 <1 %
Publication
-
- 16 S Suhartini, N Hidayat, M W R Hadi. "Co-digestion of cocoa pods and cocoa leaves: Effect of C/N ratio to biogas and energy <1 %
Publication

potential", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021

Publication

- 17 H.G. Zhang, D. Angelaszek, M. Copley, J.H. Han et al. "Performance of the ISS-CREAM calorimeter in a calibration beam test", Astroparticle Physics, 2021 <1 %
- Publication
-
- 18 Maurício Emerenciano, Gerard Cuzon, Miguel Arévalo, Maite Mascaró Miquelajauregui, Gabriela Gaxiola. "Effect of short-term fresh food supplementation on reproductive performance, biochemical composition, and fatty acid profile of Litopenaeus vannamei (Boone) reared under biofloc conditions", Aquaculture International, 2012 <1 %
- Publication
-
- 19 Siti Aisyah, Sulung Nomosatryo. "Distribusi Spasial dan Temporal Nutrien di Danau Tempe, Sulawesi Selatan", Oseanologi dan Limnologi di Indonesia, 2016 <1 %
- Publication
-
- 20 Usman Usman, Neltje Nobertine Palinggi, Enang Harris, Dedi Jusadi, Eddy Supriyono, Munti Yuhana. "ANALISIS TINGKAT KECERNAAN PAKAN DAN LIMBAH NITROGEN (N) BUDIDAYA IKAN BANDENG SERTA KEBUTUHAN PENAMBAHAN C-ORGANIK" <1 %

UNTUK PENUMBUHAN BAKTERI HETEROTROF (BIOFLOK)", Jurnal Riset Akuakultur, 2016

Publication

-
- 21 Ahmad Talib, Marlena T. "Karakteristik organoleptik dan kimia produk empek-empek ikan cakalang", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2015 <1 %
Publication
-
- 22 Eka Indah Raharjo, Sunarto ., Iwan .. "EFEKTIFITAS EKSTRAK RUMPUT LAUT (*Sargassum polycystum*) SEBAGAI ANTI BAKTERI PADA IKAN MAS (*Cyprinus carpio*) YANG TERINFEKSI BAKTERI *Aeromonas hydrophila*", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2014 <1 %
Publication
-
- 23 Endang Lenama, Novi I Bullu, Alfred G.O Kase. "STRUKTUR KOMUNITAS MAKROALGA DI PERAIRAN PANTAI PALIBO KECAMATAN KABOLA KABUPATEN ALOR", Indigenous Biologi : Jurnal Pendidikan dan Sains Biologi, 2020 <1 %
Publication
-
- 24 Ongki Doni Satriawan, Zulkhasyni Zulkhasyni, Andriyeni Andriyeni, Dedi Pardiansyah, Firman Firman. Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2021 <1 %
Publication
-

- 25 R Aken Yugo, Eko Effendi, Herman Yulianto. "NUTRIENT WASTE LOAD FROM VANAME SHRIMP (*Litopeneaus vannamei*) AND ANALYSIS OF LAND SUITABILITY BASED ON WATER QUALITY CRITERIA IN EARTH IN EAST RAWAJITU PROSPEROUS", e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, 2020
Publication
-
- 26 Refli Matheos, Juliaan Ch. Watung, Ockstan Kalesaran. "The effect of immersion in different doses of methyl testosterone hormone on survival and growth of nile tilapia larvae, *Oreochromis niloticus*", e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN, 2013
Publication
-
- 27 Suryo Kunindar, Eko Efendi, Supono Supono. "UTILIZATION OF TOFU AND TAPIOCA INDUSTRIAL LIQUID WASTE FOR NILE TILAPIA (*Oreochromis niloticus*) CULTURE WITHIN DIFFERENT BIOFLOC SYSTEMS", e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, 2018
Publication
-
- 28 Armen Nainggolan, Agus Oman Sudrajat, Nur Bambang Priyo Utomo, Enang Harris. "PENINGKATAN KINERJA REPRODUKSI, KUALITAS TELUR, DAN LARVA MELALUI SUPLEMENTASI Spirulina DIKOMBINASI

DENGAN INJEKSI OOCYTE DEVELOPER PADA
INDUK IKAN LELE (*Clarias sp.*) BETINA", Jurnal
Riset Akuakultur, 2015

Publication

-
- 29 Ilham Zulfahmi. "PENGARUH PADAT TEBAR BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH UDANG WINDU (PENAEUS MONODON FABRICIUS, 1798) YANG DIPELIHARA PADA MEDIA BIOFLOK", *Scientiae Educatia*, 2017
Publication <1 %
- 30 Yulianty Adipu. "Profil Kualitas Air Pada Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) Sistem Bioflok Dengan Sumber Karbohidrat Gula Aren", Jurnal MIPA, 2019
Publication <1 %
- 31 Abdul Mansyur, Hidayat Suryanto Suwoyo, Rachmansyah Rachmansyah. "PENGARUH PENGURANGAN RANSUM PAKAN SECARA PERIODIK TERHADAP PERTUMBUHAN, SINTASAN, DAN PRODUKSI UDANG VANAME (*Litopenaeus vannamei*) POLA SEMI-INTENSIF DI TAMBAK", Jurnal Riset Akuakultur, 2011
Publication <1 %
- 32 Eka Indah Raharjo, Rachimi ., Muhammad Arief. " PENGGUNAAN AMPAS TAHU dan KOTORAN AYAM UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI MAGGOT (*Hermetia illucens*)",
Publication <1 %

Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2016

Publication

-
- 33 Eko Prasetyo, Hendry Yanto, Amrijed .. **<1 %**
"PENGARUH EKSTRAK ASAM HUMAT TANAH GAMBUT TERHADAP HEMATOLOGI IKAN NILA (*Oreochromis niloticus*) YANG DIUJI TANTANG BAKTERI *Aeromonas hydrophila*", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2021
Publication
-
- 34 Ernawati Ernawati, Rochmady Rochmady. **<1 %**
"Effect of fertilization and density on the survival rate and growth of post-larva of shrimp vaname (*Litopenaeus vannamei*)", Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2018
Publication
-
- 35 Farida ., Eka Indah Raharjo, Arnis Maylinda Sari. **<1 %**
"SUBSTITUSI FERMENTASI BUNGKIL KELAPA SAWIT DALAM PAKAN BUATAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN GURAMI (*OSPHRONEMUS GOURAMY*)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2016
Publication

- 36 Jamal Basmal, Radian Saputra, Rahman Karnila, Tjipto Leksono. "Ekstraksi Unsur Hara dari Rumput Laut *Sargassum* sp.", Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, 2019 <1 %
Publication
-
- 37 Kukuh Adiyana, Eddy Supriyono, Amin Pamungkas, Lolita Thesiana. "EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM JARING TERHADAP RESPON PRODUKSI PENDEDERAN JUVENIL LOBSTER PASIR (*Panulirus homarus*) MENGGUNAKAN TEKNOLOGI RESIRKULASI", Jurnal Kelautan Nasional, 2017 <1 %
Publication
-
- 38 Rifky Pujautama, Muarif Muarif, Mulyana Mulyana. "RASIO KONVERSI PAKAN DAN MORTALITAS IKAN BANDENG YANG DIBUDIDAYA PADA TAMBAK SILVOAKUAKULTUR", JURNAL MINA SAINS, 2020 <1 %
Publication
-
- 39 Suwardi Tahe, Hidayat Suryanto Suwoyo. "PERTUMBUHAN DAN SINTASAN UDANG VANAME (*Litopenaeus vannamei*) DENGAN KOMBINASI PAKAN BERBEDA DALAM WADAH TERKONTROL", Jurnal Riset Akuakultur, 2011 <1 %
Publication
-

40

Wiwin Febriani, Melya Riniarti, Surnayanti Surnayanti. "Penggunaan Berbagai Media Tanam dan Inokulasi Spora Untuk Meningkatkan Kolonisasi Ektomikoriza dan Pertumbuhan *Shorea javanica*", Jurnal *Sylva Lestari*, 2017

<1 %

Publication

41

Putri Dara Yunda, Sri Murwani, Endang Linirin Widiastuti. "PENINGKATAN PERTUMBUHAN *Daphnia* sp. MENGGUNAKAN MEDIA KOTORAN AYAM YANG DICAMPUR DEDAK PADI DENGAN KONSENTRASI BERBEDA", Jurnal Ilmiah Biologi Eksperimen dan Keanekaragaman Hayati, 2016

<1 %

Publication

42

Abdul Rakhfid, Wa Ode Nanny Kulsum, Fendi Fendi, Mosriula Mosriula et al. "The use of probiotic for growth and survival of milkfish (*Chanos chanos* Forskal)", *Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, 2020

<1 %

Publication

43

Eka Indah Raharjo, Zahir Islami, . Farida. "PERSENTASE PEMANFAATAN LUMPUR KOLAM LELE, AMPAS TAHU DAN DEDAK PADI DALAM MEDIA KULTUR UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI CACING SUTERA

<1 %

(Tubifek sp.)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2018

Publication

- 44 Feri Supriadi, Rosmawati Rosmawati, Titin Kurniasih. "The Use of Blood Flour as a Substitute for Fish Meal in Feed of BEST Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*)", JURNAL MINA SAINS, 2018 <1 %
- Publication
-
- 45 Valentine D Saleky, Semuel F Tuhumury, W Waileruny. "PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT BERBASIS ANALISA KESESUAIAN LAHAN DI PERAIRAN NURUWE", TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan, 2020 <1 %
- Publication
-
- 46 Yuni Tri dea Vega, Eka Indah Raharjo, Farida Farida. "PENGGUNAAN TEPUNG DAUN TURI (Sesbania grandiflora) DALAM PAKAN BUATAN UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP IKAN GURAMI (*Osphronemus gouramy*)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2018 <1 %
- Publication
-

Exclude bibliography On